

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.V-283

### LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

| Eil. Nr. | Vakcina                                                 | Amžius      |           |        |        |        |        |            |            |         |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|---------|-----------|------------|
|          |                                                         | Iki 24 val. | 2–3 paros | 1 mėn. | 2 mėn. | 4 mėn. | 6 mėn. | 12–15 mėn. | 15–16 mėn. | 18 mėn. | 6–7 metai | 15–16 metų |
| 1        | Tuberkuliozės vakcina                                   |             | BCG       |        |        |        |        |            |            |         |           |            |
| 2        | Hepatito B vakcina                                      | HB*         |           | HB     |        |        | HB     |            |            |         |           |            |
| 3        | Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina                 |             |           |        | DTaP   | DTaP   | DTaP   |            |            | DTaP    | DTaP      | Td         |
| 4        | B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina |             |           |        | Hib    | Hib    | Hib    |            |            | Hib     |           |            |
| 5        | Poliomielito vakcina                                    |             |           |        | IPV    | IPV    | IPV    |            |            | IPV     | IPV       |            |
| 6        | Pneumokokinės infekcijos vakcina                        |             |           |        | Pnc    | Pnc    |        | Pnc**      |            |         |           |            |
| 7        | Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina           |             |           |        |        |        |        |            | MMR**      |         | MMR       |            |

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HB – hepatito B vakcina, DTaP – kokliušo (nelastelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina, Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina, Pnc – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.

2. HB\* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.

3. Pnc\*\* gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR\*\* vakcina.

4. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

5. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.