

1 lentelė. Pasaulio sveikatos organizacijos privalomų/rekomenduojamų skiepų rekomendacijos (2020/07/01)

Afganistano Islamo Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> rizika užsikrėsti vyrauja gegužės – lapkričio mėn. teritorijose, esančiose žemiau 2000 m virš jūros lygio. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Kiti reikalavimai: keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito. Rezidentams ar keliautojams, kurie <u>Afganistano Islamo Respublikoje</u> apsistoja ilgiau nei 4 savaites, vėliau išvykstant iš <u>Afganistano Islamo Respublikos</u> gali reikalauti įrodymo apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, poliomieliitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Airija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Albanijos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Amerikos Samoa	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Andoros Kunigaikštystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Angilija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Angolos Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika užsikrėsti vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Antigva ir Barbuda	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Argentinos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų vykstančių į Misiones ir Corrientes teritorijas.</u> Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Formosa, Chaco,</i>

	<p><i>Jujuy</i> ir <i>Saltos</i> provincijas.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Armėnijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Aruba	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją. Keliautojai, neturintys Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės į šalį nebus įleidžiami.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Australija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų (išskyrus <i>Galapagos salas Ekvadore</i>) bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją (išskyrus <i>Galapagos salas Ekvadore</i>).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Austrijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

<p>Azerbaidžano Respublika</p>	<p>Maliarija. <i>P. vivax</i> nedidelė rizika vyrauja birželio – spalio mėn. kai kuriose žemose vietovėse, ypač tarp <i>Kuros</i> ir <i>Arakso</i> upių. Rizikos nėra <i>Baku</i> mieste. Nuo 2013 m. vietiniai infekcijos atvejai neregistruoti. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Azorų salos</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Bahamos</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Bahreino Karalystė</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Baltarusijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (per oro</p>

<p>Bangladešo Liaudies Respublika</p>	<p>uostą) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus, ypatingai nuo gegužės iki spalio mėn. Rizika užsikrėsti maliarija vyrauja tik 13 iš 64 rajonų tiek kaimo, tiek miesto zonose. Didelė rizika užsikrėsti yra <i>Chittagong Hill Tract</i> teritorijose (<i>Bandarban, Rangamati ir Khagrachari</i>), <i>Chittagong</i> ir <i>Cox Bazaar</i> teritorijose. Infekcijos rizika maža yra <i>Hobigonj, Kurigram, Moulvibazar, Mymensingh, Netrakona, Sherpur, Sunamgonj</i> ir <i>Sylhet</i> teritorijose. <i>Dakos</i> mieste maliarijos rizikos nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Barbadosas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų (išskyrus atvykstant iš <i>Gajanos, Trinidado ir Tobago Respublikos</i>).</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Belgijos Karalystė</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Belizas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (per oro uostą) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose <i>Stan Creek</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>

Benino Respublika	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bermuda	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bisau Gvinėjos Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų.
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
Bolivijos Daugiatautė Valstybė	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų. Taip pat visiems, vyresniems nei 9 mėn. amžiaus asmenims, vykstantiems į <i>Beni, Pando</i> ir <i>Santa Cruz</i> , ir kai kurias <i>Chuquisaca, Cochabamba, La Paz</i> ir <i>Tarija</i> teritorijas – rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į teritorijas 2300 m. virš jūros lygio ir į aukščiau nepaminėtas teritorijas.
Maliarija. Didžiausia rizika <i>P. vivax</i> (99.9 proc.) vyrauja visus metus visoje šalyje. Didžiausia maliarijos rizika vyrauja <i>Beni</i> ir <i>Pando</i> , ypač <i>Guayaramerin, Riberalta, Sena</i> vietovėse. PSO rekomenduojama profilaktika: B.	

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Boneras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bosnija ir Hercegovina	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Botsvanos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika vyrauja lapkričio-gegužės/birželio mėn. šiaurinėse šalies teritorijose: <i>Bobirwa, Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Brazilijos Federacinė Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, vykstantiems į <i>Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo State, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Parana, Piaui, Rio de Janeiro State, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Tocantins, Bahia State</i> šalies teritorijas ir prie <i>Iguazu</i> krioklių.</p>
	<p>Maliarija. Didelė rizika (<i>P. vivax</i> – 88,8 proc.; <i>P. falciparum</i> – 10,6 proc.) vyrauja visus metus miškingose teritorijose, esančiose žemiau 900 m virš jūros lygio bei 9 <i>Amazon</i> regionuose: <i>Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão</i> (vakarinėje dalyje), <i>Mato</i></p>

	<p><i>Grosso</i> (šiaurinėje dalyje), <i>Pará</i> (išskyrus Belemo miestą), <i>Rondônia</i>, <i>Roraima</i> ir <i>Tocantins</i>. Didžiausia rizika – džiunglių teritorijose, tačiau užsikrėsti galima netgi kai kurių miestų <i>Cruzeiro do Sul</i>, <i>Manaus</i>, <i>Pôrto Velho</i>, <i>Boa Vista</i>, <i>Macapá</i>, <i>Marabá</i>, <i>Rio Branco</i> ir <i>Santarém</i> teritorijose. Malaria rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja: <i>Sao Paulo</i>, <i>Minas Gerais</i>, <i>Rio de Janeiro</i>, <i>Espirito Santo</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: P. vivax teritorijose – B, o P. falciparum teritorijose – C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Brunėjaus Darusalamas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusią tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja dėl <i>P. knowlesi</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: B.</p> <p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Bulgarijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Burkina Fosas</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Burundžio Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Butano Karalystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus pietinėje šalies dalyje: <i>Chukha, Dagana, Pemagatshel, Samdrup, Jonkhar, Samtse, Sarpang ir Zhemgang</i> teritorijose ištisus metus. Neregistruotas infekcijos perdavimas <i>Bumthang, Gasa, Paro ir Thimphu</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Centrinės Afrikos Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Čado Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</u>
	Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės visiems vyresniams kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i> .

	<p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čekijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čilės Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Dangun Žengimo sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Danijos Karalystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Didžiosios Britanijos Mergelių salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Dominika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B,</p>

	<p>suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Dominikos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš Brazilijos miestų: <i>Mina Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo, Rio de Janeiro</i> bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per minėtus Brazilijos miestus.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač kai kuriose vakarinės dalies provincijų kaimo vietovėse (<i>Dajabon, Elias Pina ir San Juan</i>). 2015 m. infekcijos rizika padidėjo <i>Nacionaliniame rajone</i> ir <i>Santo Domingo</i> bei <i>La Altagracia</i> provincijose, ypač <i>Bávare</i> rajone. Rizika kitose teritorijose yra nedidelė arba nežymi. Nėra duomenų apie <i>P. falciparum</i> atsparumą bet kokiam antimaliariniam vaistui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Dramblio Kaulo Kranto Respublika	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Džibučio Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios</p>

<p>Egipto Arabų Respublika</p>	<p>karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų (įskaitant ir šias teritorijas: <i>Eritrea, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania, Zambia</i>) bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją (įskaitant ir šias teritorijas: <i>Eritrea, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania, Zambia</i>).</p> <p>Jei keliautojas neturi Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, tuomet asmuo iki 6 dienų iki išvykimo bus sulaikytas karantine.</p> <p>Maliarija. Labai nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falcipatum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. įskaitant ir <i>El Fajumo</i> teritoriją. Nuo 1998 m. neregistruotas nei vienas infekcijos atvejis. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u></p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš <i>Afganistano Islamo Respublikos, Indonezijos Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos, Nigerijos, Papua Naujosios Gvinėjos, Somalio Federacinės Respublikos</i>, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos. Taip pat visiems keliautojams, atvykstantiems iš <i>Angolos Respublikos, Benino Respublikos, Kamerūno Respublikos, Centrinės Afrikos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos, Ganos Respublikos, Kenijos Respublikos, Mozambiko Respublikos, Nigerio Respublikos, Filipinų Respublikos</i>, nepriklausomai nuo amžiaus ar skiepijimo būklės, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Ekvadoro Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija.</u> Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Brazilijos Federacinės Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Ugandos Respublikos</i> bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per minėtas teritorijas.</p> <p>Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į <i>Esmeraldas, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios, Zamora-Chinchi</i> teritorijas.</p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua and Zamora-Chinchi</i> teritorijas.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (67 proc.), <i>P. falciparum</i> (33 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Esmeraldos provincijoje, Amazonės</i></p>

	<p><i>regione</i> (ypač <i>Pastaza</i> ir <i>Morano Santiago</i> vietovėse). Rizika dėl <i>P. vivax</i> egzistuoja <i>Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbios</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Eritrėja</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į šias teritorijas kaip: <i>Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel ir Semenawi Keih Bahri, Dahlak Archipelagos.</i></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (35 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (65 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2200 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra <i>Asmara</i> teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Estijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Afar</i> ir <i>Somali</i> provincijas.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (40 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (60 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2000 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra <i>Addis Ababa</i>. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Farerų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Fidžio Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Filipinų Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus teritorijose: <i>Palawan, Sultan Kudarat, Davao del Norte, Maguindanao, Sulu, Mindoro Occidental, Tawi-tawi, Cagayan Valley and Davao City.</i> PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite. Taip pat <i>Hajj</i> piligriminėse kelionėse dalyvaujantys keliautojai, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo meningokokinės infekcijos.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Folklando (Malvinų) salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Gabono Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Gajanos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų (išskyrus atvykstant iš <i>Argentinos Respublikos, Paragvajaus Respublikos, Trinidado ir Tobago Respublikos</i>) bei keliautojų vykusiu tranzitu (ilgiau nei 4 val. per šalies oro uostą) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją (išskyrus atvykstant iš <i>Argentinos Respublikos, Paragvajaus Respublikos, Trinidado ir Tobago Respublikos</i>).
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (32 proc.), <i>P. falciparum</i> (34 proc.), abiejų sukėlėjų (9 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Galapagų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Brazilijos Federacinės Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Ugandos Respublikos</i> bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per minėtas teritorijas. Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės visiems vyresniams kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į <i>Esmeraldas, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios, Zamora-Chinchi</i> teritorijas. Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua and Zamora-Chinchi</i> teritorijas.

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (67 proc.), <i>P. falciparum</i> (33 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Esmeraldos provincijoje, Amazonės regione</i> (ypač <i>Pastaza</i> ir <i>Morano Santiago</i> vietovėse). Rizika dėl <i>P. vivax</i> egzistuoja <i>Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbios</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gambijos Islamo Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Ganos Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gibraltaras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Graikijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Maliarija. Egzistuoja labai maža <i>P. vivax</i> rizika nuo gegužės iki spalio mėnesio. Turistų lankomose vietose rizikos nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Grenada</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Grenlandija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Guamo teritorija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gvadelupa</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gvatemalos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 1500 m. jūros lygio. Maža infekcijos rizika vyrauja: <i>Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz, San Marcos, Peten, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Santa Rosa, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango, Quiche</i> teritorijose. Vidutinė rizika vyrauja <i>Suchitepeques, Retalhuleu, Izabal</i> teritorijose. Didžiausia rizika – <i>Gomera, Masagua, Santa Lucia Cotzumalguapa ir Tiquisate, Telemán, Panzos, La Tinta</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: B.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gvinėjos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Haičio Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Neregistruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Hondūro Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (79 proc.), <i>P. falciparum</i> (20 proc.), abiejų sukėlėjų (0,8 proc.) vyrauja visus metus. Ypač didelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> ir <i>P.</i></p>

	<p><i>falciparum</i> kyla šiose teritorijose: <i>Gracias a Dios</i>, vidutinė rizika – <i>Atlantida, El Paraiso, Olancho, Yoro</i> teritorijose. Neregistruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: <i>P. vivax</i> rizikos teritorijose B; <i>P. falciparum</i> teritorijose – C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Indijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų. Keliautojai, atvykstantys į Indiją oro ar jūrų transportu, nepaėjęs 6 dienoms (vykstantiems jūrų transportu iki 30 dienų) po lankymosi infekuotoje šalyje ar vykę tranzitu per jas ir neturintys Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, gali būti izoluojami 6 dienoms pagal Indijoje galiojančias taisykles.</p> <p>Indijoje infekuotomis teritorijomis yra laikomos šios šalys: Afrikoje – <i>Angolos Respublika, Benino Respublika, Burkina Faso, Burundžio Respublika, Kamerūno Respublika, Centrinės Afrikos Respublika, Čado Respublika, Kongo Respublika, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Pusiaujo Gvinėjos Respublika, Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika, Gabono Respublika, Gambijos Islamo Respublika, Ganos Respublika, Gvinėjos Respublika, Bisau Gvinėjos Respublika, Kenijos Respublika, Liberija, Malio Respublika, Nigerio Respublika, Nigerija, Ruandos Respublika, Senegalo Respublika, Siera Leonė, Somalio Federacinė Respublika, Sudano Respublika, Togo Respublika, Ugandos Respublika, Mauritanijos Islamo Respublika; Jungtinėse Amerikos Valstijose</i> – <i>Argentinos Respublika, Bolivijos Daugiatautė Valstybė, Brazilijos Federacinė Respublika, Kolumbijos Respublika, Ekvadoro Respublika, Prancūzijos Gviana, Gajanos Respublika, Panama, Peru Respublika, Surinamo Respublika, Trinidado ir Tobago Respublika, Venesuelos Bolivar Respublika.</i></p> <p>Pastaba. Ši sąrašą Indijos vyriausybė gali papildyti, jei pranešama apie geltonosios karštligės atvejį.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum, P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Daugiausia maliarijos atvejų Indijoje registruojama rytinėje ir centrinėje šalies dalyje bei miškingose, kalvotose teritorijose, pavyzdžiui: <i>Odisha, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tripura, Meghalaya ir Mizoram. Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir, Sikkim</i> teritorijose rizikos nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų (<i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos, Nigerijos</i>) bei <i>Kongo Demokratinės Respublikos, Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos, Kenijos Respublikos, Somalio Federacinės Respublikos, Sirijos Arabų Respublikos</i>, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto su oraline poliomielioto vakcina, kuri buvo atlikta bent per paskutines 4 savaites iki išvykimo dienos.</p>	

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Indijos Vandenyno Britų Sritis	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Indonezijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus visoje rytinėje šalies teritorijose: <i>East Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua, West Papua</i>. Maliarijos rizika taip pat vyrauja ir kitose šalies teritorijose, išskyrus: <i>Jakarta</i>, didelius miestus ir turistų lankomas vietas. Pranešama apie registruotus <i>P. knowlesi</i> infekcijos atvejus <i>Kalimantan</i> teritorijoje. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš <i>Saudo Arabijos Karalystės</i>, turi pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją nuo meningokokinės infekcijos su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Irako Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja gegužės – lapkričio mėn. šiauriniuose šalies rajonuose, esančiuose žemiau nei 1500 m. jūros lygio (<i>Duhok, Erbil ir Sulaimaniya</i> provincijose). Nuo 2009 m. vietinių maliarijos atvejų neregistruota. PSO profilaktikos nerekomenduojama.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: iki 15 m. amžiaus vaikai, atvykstantys iš endeminių poliomielito teritorijų (<i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos</i>) Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielito trejomis vakcinacijos dozėmis. Kiti asmenys, atvykstantys iš endeminių poliomielito teritorijų (<i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos</i>)</p>

	<p>Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto su oraline poliomielioto vakcina, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki vizos išdavimo. Negalintys pateikti Tarptautinio sertifikato, įrodančio apie atliktą vakcinaciją su oraline poliomielioto vakcina, keliautojai pasienyje bus paskiepyti nuo poliomielioto.</p> <p>Irako Respublikos keliautojams, vykstantiems į „meninginio diržo“ šalis, esančias Afrikos žemyne bei vykstantiems į <i>Hajj, Umrah</i> piligrimines keliones, turi pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją nuo meningokokinės infekcijos su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135). Taip pat keliautojai, prieš 10 dienų iki atvykimo į Iraką Respubliką iš „meninginio diržo“ šalių, esančių Afrikos žemyne, turi pasiskiepyti ir pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją nuo meningokokinės infekcijos su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Irano Islamo Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> bei maža rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja kovo – lapkričio mėn. <i>Hormozgan, Kerman</i> (tropinėje dalyje) ir <i>Sistan – Baluchestan</i> (pictinėje dalyje) provincijų kaimo vietovėse. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų (<i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos, Nigerijos</i>), Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos. Negalintys pateikti Tarptautinio sertifikato, įrodančio apie atliktą vakcinaciją, keliautojai pasienyje bus paskiepyti viena vakcinos doze nuo poliomielioto.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Islandija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Ispanijos Karalystė</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės</p>

	revakcinacija.
Italijos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Izraelis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jamaika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Kiti reikalavimai: Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į Jamaiką turistiniais tikslais ne ilgiau nei 30 dienų laikotarpiui, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo tymų, raudonukės ir poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Japonija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jemeno Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač rugsėjo-vasario mėn., visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio, išskyrus <i>Sana</i> miestą. Ribota rizika stebima <i>Socotra</i> saloje. PSO rekomenduojama profilaktika: C, o Socotra saloje – A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jordanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jungtinė Karalystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jungtinės Amerikos Valstijos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jungtinių Amerikos Valstijų Mergelių salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jungtiniai Arabų Emyratai	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Juodkalnija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Kaimanų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kalėdų sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų (išskyrus <i>Galapagos salas Ekvadore</i>) bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją (išskyrus <i>Galapagos salas Ekvadore</i>).
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kambodžos Karalystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus, ypač miškingose vietovėse. Infekcijos rizikos nėra šiose teritorijose: <i>Phnom Penh</i> ir <i>Tonle Sap (Siem Reap)</i> . Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas: <i>artesunatui, meflokinui, lumefantrinui</i> ir <i>piperekvinui</i> – <i>Vakarų Kambodžoje</i> ir tęsiasi iki šalies centro. <i>P. vivax</i> atsparumas – <i>chlorochinui</i> , pastebėtas <i>Rytų Kambodžoje</i> . PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kamerūno Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių

	šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kanada	Nėra privalomų skiepijimų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kanarų salos	Nėra privalomų skiepijimų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kataras	Nėra privalomų skiepijimų keliautojams.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų (<i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos, Nigerijos, Filipinų Respublikos</i>), Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kazachstano Respublika	Nėra privalomų skiepijimų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (per oro uostą) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kenijos Respublika	Nėra privalomų skiepijimų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų. Paprastai nerekomenduojama skiepytis nuo geltonosios karštligės keliautojams, vykstantiems į Šiaurės rytų provinciją: <i>Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi, Tanariver Coastal</i> provinciją, <i>Nairobi</i> ir <i>Mombasa</i> miestus.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalyje

	<p>teritorijoje. Nedidelė maliarijos rizika vyrauja Nairobyje ir teritorijose, esančiose aukščiau nei 2500 m. jūros lygio (Centrinėse, Rytinėse, Vakarinėse ir <i>Nyanza, Rift Valley</i> provincijose). PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kinijos Liaudies Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (per oro uostą) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Šis reikalavimas netaikomas keliautojams, kurie vyksta tik į <i>Hong Kong</i> ir <i>Macao</i> specialiuosius administracinius regionus.</p>
	<p>Maliarija. Nuo 2017 m. vietiniais maliarijos atvejais neregistruojami. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Kipro Respublika</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kirgizijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kiribačio Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kiurasao</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš</p>

	<p>endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kolumbijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Angolos Respublikos, Brazilijos Federacinės Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Ugandos Respublikos</i> bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per minėtas teritorijas.</p> <p>Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į <i>Kolumbijos Respubliką</i>.</p> <p>Skiepytis nuo geltonosios karštligės nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į vietas esančias aukščiau 2300 m. virš jūros lygio, pavyzdžiui keliaujantiems į <i>Bogota, San Andrés y Providencia, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín</i> teritorijas.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja: <i>Antioquia (El Bagre, Vigía del Fuerte, Segovia, Tarazá, Zaragoza, Cáceres, Nechí, Murindó, Anorí, Remedios, Mutatá, Frontino, San Pedro de Urabá, Dabeiba, Valdivia, and Caucasia), Amazonas (Tarapacá, La Pedrera, Puerto Nariño, Leticia, Miriti-Paraná, and La Chorrera), Bolívar (Montecristo, Norosi, Tiquisio and San Pablo), Cauca (Timbiquí), Chocó (Bagadó, Nóvita, Lloró, Tadó, Río Quito, El Cantón del San Pablo, Río Iro, Atrato, Bojaya, San José del Palmar, Quibdó, Bajo Baudó, Medio San Juan, Carmen de Darien, Nuquí, Medio Baudó, Alto Baudó, Istmina, Bahía Solano, Medio Atrato, Juradó, Sipí, Unión Panamericana, Condoto, and Certegui), Córdoba (Puerto Libertador and Tierralta), Guainía (Inirida and La Guadalupe), Nariño (Roberto Payán, Olaya Herrera, El Charco, Mosquera, Barbacoas, Santa Barbarba, Magüi, Francisco Pizarro, and San Andrés de Tumaco), Risaralda (Pueblo Rico and La Virginia), Valle del Cauca (Cartago), Vaupés (Taraira and Yavarate) and Vichada (Puerto Carreño and Cumaribo).</i> Vidutinė infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: <i>Antioquia, Amazonas, Bolívar, Cauca, Choco, Córdoba, Guajira, Narino</i> ir <i>Risaralda</i> teritorijose. Nedidelė rizika vyrauja keliaujant kai kuriose šių miestų teritorijose: <i>Amazona, Caqueta, Guaviare, Guainia, Meta, Putumayo, Vaupes,</i> ir <i>Vichada</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>	
<p>Komorų Sąjunga</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Kongo Demokratinė Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kongo Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.
	Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose pietinėse šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Korėjos Respublika (Pietų Korėja)	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose šiaurinėse šalies teritorijose, dažniausiai <i>Gangwon-do</i> ir <i>Gyeonggi-do</i> provincijų teritorijose bei <i>Incheon</i> mieste. PSO rekomenduojama profilaktika: A.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kosta Rikos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei iš <i>Tanzanijos, Zambijos Respublikos, Kolumbijos Respublikos</i> (išskyrus <i>Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin, San Adres Providencia, Bogota</i>); <i>Ekvadoro Respublikos</i> (tik iš <i>Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios, Zamora-Chinchipe</i>); <i>Paragvajaus Respublikos</i> (išskyrus <i>Asuncion</i>); <i>Peru Respublikos</i> (išskyrus <i>Lima, Cuzco, el Machu Picchu, la Ruta de los Incas, Lambayeque, Tumbes, Piura, Cajamarca</i>); <i>Trinidado ir Tobago Respublikos</i> (išskyrus Ispanijos uosto miestų teritorijas, ir keliaujantiems tranzitu ar keliaujantiems tik <i>Tobago</i> saloje).</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja šalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kroatijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kubos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuko salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuveitas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Laoso Liaudies Demokratinė Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus <i>Vientiane</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
<p>Latvijos Respublika</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Lenkijos Respublika</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Lesoto Karalystė</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Libano Respublika</p>	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų ar vykstantys į poliomielite endemines teritorijas, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite. Taip pat keliautojai, vykstantys į <i>Hajj, Umrah</i> piligrimines keliones ir į kai kurias Afrikos šalis, turi pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją nuo meningokokinės infekcijos su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Liberija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9</p>

	<p>mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Libija	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš <i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos</i>, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.</p> <p>Taip pat keliautojai turi pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją nuo meningokokinės infekcijos su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135).</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Lichtenšteino kunigaikštystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Lietuvos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Madagaskaro Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, ypač pakrančių teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Madeira</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Majotas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Maža infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Malaizija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Šalyje yra riboti maži maliarijos židiniai atokiose vietovėse (<i>Sabah, Sarawak</i> ir <i>Peninsular</i>). Rizikos nėra miestuose ir pakrantės teritorijose. Pranešama apie registruotus infekcijos atvejus dėl <i>P. knowlesi</i> sukėlėjo. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Malavio Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Maldyvų Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų ir vykstantys į endemines poliomielite teritorijas, taip pat <i>Hajj, Umrah</i> piligriminėse kelionėse dalyvaujantys keliautojai, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Malio Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u> Paprastai skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i> .
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Maltos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją. Jei yra būtina, jaunesni nei 9 mėn. kūdikiai, atvykstantys iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų, gali būti izoliuojami ar stebimi.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Marianos Šiaurinių Salų Sandrauga	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Maroko Karalystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Maršalo Salų Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Martinika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Mauricijaus Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mauritanijos Islamo Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Paprastai skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje išskyrus šiaurines teritorijas: <i>Dakhlet - Nouadhibou</i> ir <i>Tiris - Zemour</i>. Liepos - spalio mėn. (liūčių laikotarpiu) maliarijos rizika vyrauja <i>Adrar</i> ir <i>Inchiri</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Meksikos Jungtinės Valstijos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, retai lankomose turistų. Nedidelė infekcijos rizika vyrauja <i>Chiapas State (Costa)</i> teritorijoje. Tokiose šalies teritorijose kaip: <i>Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo</i> maliarijos rizika labai maža. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mianmaro Sąjungos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo, miškingose, kalnuotose ir pakrančių teritorijose <i>Rahkine State</i>. Infekcijos rizikos miestuose ir miesto rajonuose nėra. Registruotas atsparumas meflokinui <i>Kayin State</i> ir rytinėje <i>Shan State</i> teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui.</p>

	<p>Šalyje registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mikronezijos Federacinės Valstijos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Moldovos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Monako Kunigaikštystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mongolija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Montseratas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per oro uostą per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mozambiko Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Namibijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio - birželio mėn. <i>Ohangwena, Otjozondjupa, Oshana, Oshikoto, Omusati, Omaheke</i> rajonuose ir visus metus prie <i>Kunene</i> upės (<i>Kunene regione</i>), <i>Zambesi</i> upės (<i>Zambesi regione</i>) <i>Okavango</i> upės (<i>Kavango regione</i>). PSO rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Naujoji Kaledonija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Naujoji Zelandija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Nauru	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

<p style="text-align: center;">Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika</p>	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusią tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcija paplitusi pietiniame <i>Terai</i> regione, dažniausiai palei miškus, papėdes, miško pakraščius ir viršutiniuose kalvotuose upių slėniuose. Maliarijos pikas registruojamas lietaus sezono metu, ypatingai nuo gegužės iki rugpjūčio mėn. Ši rizika daugiausia kyla dėl <i>P. vivax</i>, taip pat retkarčiais infekcijos protrūkiai dėl <i>P. falciparum</i> būdingi nuo liepos iki spalio mėn. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš <i>Afganistano Islamo Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos, Kenijos Respublikos, Nigerijos, Somalio Federacinės Respublikos, Papua Naujosios Gvinėjos</i>, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Nigerija</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Nigerio Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepytis tiems keliautojams, kurie keliaus tik po Sacharos dykumą.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, vykstantys į <i>Umrah</i> ir <i>Hajj</i> piligrimines keliones ar</p>

	<p>sezoniniam darbui, turi pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą, patvirtinantį vakcinaciją su keturvalente polisacharidine vakcina (A, C, Y, W135) nuo meningokokinės infekcijos.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Nikaragvos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (79,2 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (20,8 proc.) vyrauja visus metus didesnėse šalies teritorijose: <i>Autónoma del Atlántico Norte</i> regionuose, <i>Boaca</i>, <i>Chinandega</i>, <i>Jinoteca</i>, <i>Léon</i> ir <i>Matagalpa</i>. Didžiausia infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Autónoma del Atlántico Norte</i> regionuose, <i>Rosita</i>, <i>Siuna</i>, <i>Bonanza</i>, <i>Puerto Cabezas</i>, <i>Waspan</i>. <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui – neregistruotas. PSO rekomenduojama profilaktika: P. vivax rizikos teritorijose: B. o P. falciparum – C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Niujė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Nyderlandai	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Norfolko sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų (išskyrus <i>Galapagos salas Ekvadore</i>) bei</p>

	<p>keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją (išskyrus <i>Galapagos salas Ekvadore</i>).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Norvegijos Karalystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Omano Sultonatas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. 2010 m. buvo registruoti vietiniai <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> protrūkiai <i>Ash Sharqiyah North Governorate</i> teritorijoje. Vietiniai infekcijos atvejai registruoti 2011 ir 2012 m. <u>PSO profilaktika nerekomenduojama.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomiélito teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomiélito.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Pakistano Islamo Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 2000 m. jūros lygio, liepos – gruodžio mėn. kaimo vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojams, atvykstantiems į šalį ilgiau nei keturioms savaitėms bei keliautojams, išvykstantiems iš šalies skiriama oralinė vakcina nuo poliomiélito. Visiems paskiepytiems keliautojams yra išduodamas Tarptautinis sertifikatas, kuriame bus nurodyta informacija apie atliktą vakcinaciją nuo poliomiélito.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, poliomielito, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Palau	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Panama	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Nuo geltonosios karštligės rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į rytus nuo <i>Panamos Kanalo zonos (Comarcas of Emberá ir Kuna Yala, Darién ir Colón provincija)</i>.</p> <p>Paprastai skiepytis nuo geltonosios karštligės nerekomenduojama vykstantiems į vakarus nuo <i>Panamos Kanalo zonos</i>, pačioje <i>Panamos kanalo teritorijoje</i>, <i>Panamos mieste, Balbao ir San Blas salose</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (>99 proc.) vyrauja visus metus provincijose prie <i>Atlanto</i> krantų ir ties siena su <i>Kosta Rika</i> ir <i>Kolumbija: Bocas del Toro, Chiriqui, Colon, Darien, Ngobe Bugle, Panama</i> ir <i>Veraguas</i>. <i>Panamos mieste, Kanalo zonoje</i> ir kitose provincijose rizika maža arba visai nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: rizikos teritorijose – B, rytinėse šalies endeminėse teritorijose besiribojančiose su Kolumbija: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Papua - Naujoji Gvinėja	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per oro uostą per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 1800 m. jūros lygio. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių</p>

	šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Paragvajaus Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų. Nerekomenduojama skiepytis asmenims vykstantiems į <i>Asuncion</i> miestą.
	Maliarija. Labai maža infekcijos rizika. Vietinių infekcijos atvejų neregistruojama nuo 2012 m. Ankstesni susirgimai buvo registruoti <i>Alto Parana</i> , <i>Canindeyu</i> , ir <i>Caaguazu</i> šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Peru Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, vykstantiems į miškingas teritorijas, džiungles, esančias žemiau kaip 2300 m virš jūros lygio: <i>Amazonas</i> , <i>Loreto</i> , <i>Madre de Dios</i> , <i>San Martin</i> , <i>Ucayali</i> , <i>Puno</i> , <i>Cuzco</i> ; <i>Junín</i> , <i>Pasco</i> ir <i>Huánuco</i> , <i>Apurímac</i> ; šiaurės <i>Huancavelica</i> ; šiaurės rytai <i>Ancash</i> ; rytų <i>La Libertad</i> ; šiaurės ir rytų <i>Cajamarca</i> ; šiaurės ir šiaurės rytų <i>Ayacucho</i> ir rytų <i>Piura</i> teritorijas. Vykstantiems tik į <i>Andes</i> , <i>Cuzco miestą</i> , <i>Limą</i> , <i>Machu Picchu</i> , <i>Inca Trail</i> teritorijas skiepytis nuo geltonosios karštligės nerekomenduojama.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (84 proc.), <i>P. falciparum</i> (16 proc.) vyrauja visus metus kaimo teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Rizikos teritorijos yra <i>Amazonas</i> , <i>Junín</i> , <i>San Martin</i> , <i>Loreto</i> . 98 proc. <i>P. falciparum</i> atvejų buvo registruoti <i>Loreto</i> apskrityje, šalia Amazonės. PSO rekomenduojama profilaktika <i>P. vivax</i> rizikos teritorijose: B; Loreto apskrities teritorijose - C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Pietų Afrikos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose <i>Mpumalango</i> ir <i>Limpopo</i> provincijose (įskaitant <i>Kruger</i> Nacionalinį parką), taip pat Šiaurės provincijose ir šalies šiaurės rytinės dalies <i>KwaZulu-Natal</i> srityje. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja spalio-gegužės mėn. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Pietų Sudanas</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip <u>9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Pitkerno sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Portugalija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Prancūzijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato,</p>

<p>Prancūzijos Gviana</p>	<p><u>patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Didelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (45 proc.), <i>P. vivax</i> (55 proc.) vyrauja visus metus teritorijose, besiribojančiose su Brazilijos Federacine Respublika (<i>Oiapoque river valley</i>) ir Surinamu (<i>Maroni river valley</i>). 13 apskričių teritorijose, infekcijos rizika maža. Taip pat kur vyksta migracija iš Brazilijos yra registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas daugumai antimaliarinių vaistų. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Prancūzijos Polinezija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Puerto Riko sandrauga</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Pusiaujo Gvinėjos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Reunjonas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Rytų Timoro Demokratinė Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Ruandos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Rumunija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Rusijos Federacija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Labai ribota infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> tose rajonuose, kuriuose didelė migracija iš pietų šalių. PSO profilaktikos nerekomenduoja.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Saba	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Sakartvelas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriuose kaimo vietovėse, esančiuose pietrytinės šalies dalyje besiribojančiuose su Azerbaidžanu. PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito. Keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų ir negalintys pateikti Tarptautinio sertifikato, įrodančio apie atliktą vakcinaciją, pasienyje bus paskiepyti oraline vakcina nuo poliomieliito.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Salamono salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, išskyrus kai kurias rytines ir pietines saleles. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Salvadoro Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Maliarija. Labai maža infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kaimiškose vietovėse. PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

<p>Samoa Nepriklausomoji Valstybė</p>	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>San Marino Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per oro uostą per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Saudo Arabijos Karalystė</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Labai maža infekcijos rizika vyrauja tik kaimuose, esančiuose pasienyje su Jemenu (išskyrus Asiro provincijos aukštikalnes), daugiausia dėl <i>P. falciparum</i> ir dažniausiai vyrauja rugsėjo – sausio mėnesiais. Maliarijos rizikos nėra <i>Mecca</i> ir <i>Medina</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai (visi vyresni nei 2 m. amžiaus vaikai ir suaugusieji), vykstantys į <i>Umrah</i> ir <i>Hajj</i> piligrimines keliones ar sezoniniam darbui, turi pateikti galiojantį Tarptautinį sertifikatą, patvirtinantį vakcinaciją su keturvalente polisacharidine vakcina (A, C, Y, W135) nuo meningokokinės infekcijos (ne anksčiau kaip 10 dienų iki išvykimo ir ne vėliau kaip 3 metai iki atvykimo į <i>Saudo Arabijos Karalystę</i>) arba su keturvalente konjuguota vakcina (A, C, Y, W135) nuo meningokokinės infekcijos (ne anksčiau kaip 10 dienų iki išvykimo ir ne vėliau kaip 5</p>

	<p>metai iki atvykimo į <i>Saudo Arabijos Karalystę</i>).</p> <p>Taip pat visi keliautojai atvykstantys iš <i>Afganistano Respublikos, Kamerūno Respublikos, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Pusiaujo Gvinėjos Respublikos, Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos, Gvinėjos Respublikos, Irako Respublikos, Kenijos Respublikos, Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos, Liberijos, Madagaskaro Respublikos, Mianmaro Sąjungos Respublikos, Nigerijos, Pakistano Islamo Respublikos, Nigerio Respublikos, Siera Leonės, Somalio Federacinės Respublikos, Pietų Sudano, Sirijos Arabų Respublikos, Ukrainos ir Jemeno Respublikos</i> privalo turėti galiojantį Tarptautinį sertifikatą, patvirtinantį vakcinaciją nuo poliomiélito (bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepiję). Visi keliautojai, atvykę į <i>Saudo Arabijos Karalystę</i> iš <i>Afganistano Respublikos, Mianmaro Sąjungos Respublikos, Nigerijos, Pakistano Islamo Respublikos, Papua Naujosios Gvinėjos, Sirijos Arabų Respublikos, Somalio Federacinės Respublikos ir Jemeno Respublikos</i> nepriklausomai nuo amžiaus ir skiepavimo būklės šalies pasienyje bus paskiepyti 1 oraline vakcinos doze nuo poliomiélito.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Seišeliai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomiélito teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomiélito. Taip pat keliautojai, norėdami gauti darbuotojų vizą šalyje, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo tymų, raudonukės.</p>
<p>Sen Pjeras ir Mikelonas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei</p>

<p>Senegalo Respublika</p>	<p>keliautojų vykusių tranzitu per oro uostą per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Mažesnė infekcijos rizika vyrauja sausio – birželio mėn. tik Centrinuose vakarų regionuose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sent Kristoferio ir Nevio Federacija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją su oraline vakcina nuo poliomielioto.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sent Lusija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sent Vinsentas ir Grenadinai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Serbijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Siera Leonė	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Singapūro Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Sint Eustatijus	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Sint Martenas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Sirija Arabų Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> yra ribota, ir vyrauja gegužės-spalio mėn. ties šiaurine šalies siena, ypač šiaurės rytinėje dalyje ir <i>El Hasaka Governorate</i> kaimo vietovėse (maliarijos atvejų neregistruota nuo 2005 m.). <u>PSO profilaktikos nerekomenduoja.</u>
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš <i>Kamerūno Respublikos, Pusiaujo Gvinėjos Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos</i> bei keliautojams vykstantiems iš <i>Sirijos Arabų Respublikos</i> į kitas šalis, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielito.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Slovakijos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Slovėnijos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Somalio Federacinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją. Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į šiuos regionus: <i>Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle ir Middle Shabelle.</i>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja Centrinėje ir Pietinėje šalies dalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Sudano Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik <i>Sacharos dykumoje</i> ir į <i>Khartoum miestą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Labai maža rizika vyrauja šalies šiaurėje, Raudonosios jūros pakrantėje, didesnė rizika – centrinėje bei pietinėje šalies dalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Suomijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Surinamo Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (40%), <i>P. vivax</i> (58%) ir mišrių infekcijų (2%) pastaraisiais metais mažėja. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja ties rytine šalies siena ir aukso kasybos rajonuose. Nuo 1968 m. <i>Paramaribo</i> mieste bei kitose septyniose pakrantės vietovėse maliarijos atvejų neregistruota. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas meflokinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Svazilandas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per oro uostą per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose žemumose, ypač <i>Big Bende, Mhlume, Simunye ir Tshaneni</i> . Didžiausia infekcijos rizika vyrauja lapkričio – gegužės mėn. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šiaurės Makedonijos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šv. Bartolomėjaus sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šv. Elenos sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš

	<p>endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šv. Martyno sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Švedijos Karalystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šveicarijos Konfederacija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tadžikistano Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Paskutinis vietinis atvejis dėl <i>P. falciparum</i> registruotas 2009 m., o dėl <i>P. vivax</i> – 2015 m. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. ties pietine šalies siena (<i>Khatlon regionas</i>), kai kuriose centrinėse (<i>Dushanbe</i>), vakarinėse (<i>Gorno-Badakhshan</i>) ir šiaurinėse (<i>Leninabad regionas</i>) šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tailando Karalystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus kaimo teritorijose, ypač – miškingose, kalnuotose vietovėse, taip pat šalies pasienyje. Infekcijos rizikos nėra didžiuosiuose miestuose (<i>Bangkok, Chiang Mai city, Pattaya</i> ir kituose miestuose), <i>Samui ir Phuket salose</i>. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas meflokinui, kai kuriose teritorijose ties šalies siena su <i>Cambodia</i> ir <i>Myanmar</i>, o <i>P. vivax</i> atsparumas – chlorochinui; Taip pat registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. PSO rekomenduojama profilaktika: rizikingose teritorijose A, o prie Cambodia ir Myanmar sienų: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Tanzanija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 1800 m jūros lygio. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Terksas ir Kaikosas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Togo Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Tokelau</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tongos Karalystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Trinidado ir Tobago Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija.</u> todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, į kurių maršrutą yra įtrauktas <i>Trinidadas</i> . Keliaujantiems kruiziniais laivais ar oro transportu vykstantiems tik į <i>Tobagą</i> - skiepytis nebūtina.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tristanas da Kunja	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tuniso Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Turkija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizikos šalies teritorijose – nėra, o paskutinis vietinis infekcijos atvejis registruotas 2010 m. <u>PSO profilaktikos nerekomenduoja.</u> Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

<p>Turkmėnistanas</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Tuvalu</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Ugandos Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Ukraina</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomiélito teritorijų, Tarptautiniame sertifikate privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomiélito, kuri buvo atlikta per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo dienos.</p> <p>Asmenys, įpareigoti skubiai vykti į tarptautines keliones, prieš išvykdami turi būti paskiepyti viena vakcinos doze nuo poliomiélito.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Urugvajaus Rytų Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Pavieniai infekcijos atvejai dėl <i>P. vivax</i> buvo registruoti kai kuriuose pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, besiribojančiuose su <i>Afganistano Islamo</i></p>

<p>Uzbekistano Respublika</p>	<p><i>Respublika, Kirgizijos Respublika ir Tadžikistano Respublika.</i> PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Vanuatu</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Maža ir vidutinė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. Maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vis dar egzistuoja. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Veiko sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Venesuelos Bolivar Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonoji karštligė. Endeminė šalies teritorija, todėl Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Brazilijos Federacinė Respublikos</i> bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per <i>Brazilijos Federacinę Respubliką</i>.</p> <p>Pasiskiepyti nuo geltonosios karštligės rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams.</p> <p>Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas ir Yaracuy, Distrito Federal</i> valstijas. Taip pat vykstant į teritorijas esančias aukščiau nei 2300 m. aukštyje: <i>Trujillo, Merida, ir Tachira; Falcon ir Lara; Margaritos Sala; Caracas; Valencia.</i></p> <p>Maliarija. Didžiausia infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (74,6 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (25,4 proc.) vyrauja visus metus kai kurių rajonų (<i>Amazonas, Anzoategui, Bolívar, Delta Amacura</i>) kaimo vietovėse. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Apure, Monagas, Sucre ir Zulia</i> vietovėse. Dažniausia <i>P. falciparum</i> rizika - <i>Amazono (Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare) ir Bolivar (Angostura, Cedenó, Ell Callao, Heres, Gran Sabana, Piar, Rocio, Sifontes), ir Sucre (Benitez, Bermudez, Cajigal y Arismendi) džiunglių teritorijose.</i> PSO rekomenduojama profilaktika: P.vivax rizikos teritorijose - B, P. falciparum rizikos teritorijose C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Vengrija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Vietnamo Socialistinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus išskyrus miesto centrus: <i>Red River delta, Mekong delta</i> bei pakrantės lygumą <i>Centriniame Vietname</i> . Didžiausia infekcijos rizika yra kalnuotose vietovėse žemiau nei 1500 m. jūros lygio 18°N į pietus esančiose teritorijose, ypač – <i>Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai ir Kon Tum, Binh Phuoc provincijose</i> bei vakarinėse <i>Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam and Quang Tri pakrantės</i> vietovėse. Taip pat yra registruotas atsparumas meflokinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
Vokietijos Federacinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Volisas ir Futūna	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
Zambijos Respublika	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
Zambijos Respublika	Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.
	Paprastai skiepytis nuo geltonosios karštligės nerekomenduojama keliautojams,

	<p>vykstantiems į <i>Šiaurės Vakarų ir Vakarų provincijas</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Zimbabvės Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per endeminę geltonosios karštligės teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio – birželio mėn. teritorijose, esančiose žemiau nei 1200 m. jūros lygio ir visus metus <i>Zambezi žemumoje</i>. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Harare</i> ir <i>Bulawayo</i> rajonuose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Žaliojo Kyšulio Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonoji karštligė. Tarptautinio sertifikato, patvirtinančio vakcinaciją nuo geltonosios karštligės, reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš endeminių geltonosios karštligės teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugpjūčio-lapkričio mėn., įskaitant <i>Santiago salą</i> ir <i>Boa Vista salą</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Informacija apie skiepėjimus keliautojams teikiama tel. 8 52 300 124 arba 8 52 300 123 bei el. paštu: keliautojams@ulac.lt;

Daugiau informacijos galite rasti ULAC internetinėje svetainėje: <http://www.ulac.lt/lt/keliautojams>

Informacijos šaltiniai:

1. Countries with risk of yellow fever transmission and countries requiring yellow fever vaccination. *World Health Organization*. Geneva, July 1, 2020 [[https://www.who.int/publications/m/item/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission-and-countries-requiring-yellow-fever-vaccination-\(july-2020\)](https://www.who.int/publications/m/item/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission-and-countries-requiring-yellow-fever-vaccination-(july-2020))].

2. International travel and health. *World Health Organization*. [<http://www.who.int/ith/en/>].
3. Vaccination requirements and recommendations for international travellers, including yellow fever and malaria (List of countries, territories and areas). *World Health Organization*. Geneva, July 1, 2020. [<https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travelers-and-malaria-situation-per-country-2020-edition>].