


TYMŲ EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA

Tymai - tai ūmi, itin užkrečiama virusinė infekcija, kuri buvo ir iki šiol yra viena dažniausių mirčių priežasčių tarp visų vakcinomis kontroliuojamų ligų.


2014 metais Lietuvoje registruoti 11 tymų atvejų (0,38 atv. 100 tūkst. gyv.). 2013 metais Lietuvoje registruotas tymų protrūkis, susirgo 35 asmenys (1,18 atv./100 tūkst. gyv.). 2012 m. Lietuvoje registruoti 2 tymų atvejai (0,07 atv./100 tūkst. gyv.). 2011 m. buvo nustatyti 7 tymų atvejai (0,22 atv./100 tūkst. gyv.) (23 pav.). 2002 m. Lietuvoje įvyko tymų protrūkis. Skiepimų nuo tymų apimtys 2014 m. buvo nežymiai didesni nei 2013 m. 2 m. amžiaus grupėje sudarė 93,36 %, 7 m. amžiaus grupėje – 91,79 %.

23 pav. **Sergamumas tymais, 2004 – 2014 m.**



2014 metais tymais dažniausiai sirgo žmonės virš 30 metų. 0-14 metų amžiaus grupėje registruoti 2 susirgimai, abu susirgusieji vyrai. 20-29 metų amžiaus grupėje sirgo vienas vyras. Virš 30 metų amžiaus grupėje sirgo 5 moterys ir 3 vyrai (24 pav.).


24 pav. **Tymų atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį 2014 m.**



Iš visų sirgusiųjų 6 asmenys buvo neskiepyti, 2 - gavo tik viena vakcinos dozę, 2 – dvi vakcinos dozes ir vieno asmens skiepavimo būklė buvo nežinoma (25 pav.).


Visų atvejų galutinė diagnozė buvo tyrai be komplikacijų. 10 sirgusiųjų buvo hospitalizuota, vienas asmuo gydėsi namuose.

25 pav. **Tymų atvejų pasiskirstymas pagal skiepavimo būklę 2014 m.**



Nuo 2003 iki 2014 m. Lietuvoje tymais sirgo 59 asmenys, 31 vyras ir 28 moterys. Dažniausiai sirgo asmenys vyresni nei 30 metų (15 vyrų ir 21 moteris). 0-14 metų amžiaus grupėje sirgo 6 vyrai ir 5 moterys, 15-19 metų grupėje- 3 vyrai, 20-29 m. sirgo 7 vyrai ir 2 moterys (26 pav.).

26 pav. Tymų atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį nuo 2003 iki 2014 m.



Nuo 2003 iki 2014 m. tymų virusu užsikrėtusių asmenų skiepavimo būklė 45 % atvejų buvo nežinoma. 27 % visų atvejų buvo neskiepyti, 23 % - gavo tik viena skiepo dozė, tik 5 % buvo skiepyti dvejomis vakcinų dozėmis (27 pav.).

27 pav. Tymų atvejų pasiskirstymas pagal skiepavimo būklę nuo 2003 iki 2014 m.

