

ĮVAIRIŲ ŠALIŲ, TERITORIJŲ IR VIETŲVIŲ SĄRAŠAS

(Keliautojams būtinų/rekomenduojamų skiepų, taip pat geltonojo drugio ir maliarijos prevencinių priemonių rekomendacijos pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, 2017 m. vasario 16 d.)

2 lentelė. Imunoprofilaktikos, antimaliarinių vaistų reikalavimai bei rekomendacijos pagal įvairias pasaulio šalis (teritorijas, vietas).

Afganistanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų geltonojo drugio teritorijų.
	Maliarija. <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> rizika užsikrėsti vyrauja gegužės - lapkričio mėn. teritorijose, esančiose žemiau 2000 m virš jūros lygio. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Airija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Albanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Alžyras	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. <i>P. vivax</i> rizika labai nedidelė. Pavieniai atvejai registruoti pietiniuose ir pietryčių kaimeliuose (<i>Adrar, El Qued, Ghardaia, Illizi, Quargla, Tamanrasset</i>). <u>PSO profilaktikos nerekomenduoja.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių

	šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Amerikos Samoa (<i>JAV užjūrio teritorija</i>)	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Andora	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Angilija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Angola	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika užsikrėsti vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Antigva ir Barbuda	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Argentina	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų vykstančių į <i>Misiones</i> ir

	<p><i>Corrientes</i> teritorijas.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Formosa, Chaco, Jujuy</i> ir <i>Salto</i> provincijas.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė <i>P. vivax</i> rizika vyrauja tik <i>Oran</i> ir <i>San Martin (Salta provincijos</i> šiaurinės šalies dalyje) bei <i>Corrientes</i> ir <i>Misiones</i> provincijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Armėnija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
Australija	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus <i>Galapagos</i> salas <i>Ekvadore</i> ir <i>Misioneso</i> provinciją <i>Argentinoje</i>.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Austrija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Azerbaidžanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. <i>P. vivax</i> nedidelė rizika vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriose žemose vietovėse, ypač tarp <i>Kuros</i> ir <i>Arakso</i> upių. Rizikos nėra <i>Baku</i> mieste (sostinėje). <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Azorų salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bahamos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bahreinas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Baltarusija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bangladešas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Didelė rizika užsikrėsti <i>Chittagong Hill Tract</i> teritorijose (<i>Bandarban, Rangamati ir Khagrachari</i>), <i>Chittagong</i> ir <i>Cox Bazaar</i> teritorijose. Infekcijos rizika maža yra <i>Hobigonj, Kurigram, Moulvibazar, Mymensingh, Netrakona, Sherpur, Sunamgonj</i> ir <i>Sylhet</i> teritorijose. <i>Dakos</i> mieste maliarijos rizikos nėra. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Barbadosas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus atvykstant iš <i>Gajanos, Surinamo, Trinidado ir Tobago</i>).
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Belgija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Belizas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose <i>Stan Creek</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų (įskaitant Belizą ar gyvenančius Belize) privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Beninas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per geltonojo drugio infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės

	revakcinacija.
Bermudų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bisau Gvinėja	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bolivija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat visiems, vyresniems nei 9 mėn. amžiaus asmenims, vykstantiems į <i>Beni, Pando</i> ir <i>Santa Cruz</i> , ir kai kurias <i>Chuquisaca, Cochabamba, La Paz</i> ir <i>Tarija</i> teritorijas rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į teritorijas 2300 m. virš jūros lygio ir į aukščiau nepaminėtas teritorijas.
	Maliarija. Didžiausia rizika <i>P. vivax</i> (94 proc.) vyrauja visus metus visoje šalyje. Maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Santa Cruz</i> ir šiaurinėje šalies teritorijoje - <i>Beni</i> ir <i>Pando</i> , ypač <i>Guayaramerin, Riberalta</i> vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: B.</u> o vykstant į <i>Beni, Pando, Santa Cruz</i> teritorijas: <u>C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Boneras, Sint Eustatijus, Saba <i>(BES salos arba Karibų Nyderlandai)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.

	<p>Reikalavimas galioja tik keliautojams, vykstantiems į <i>Bonaire, Saba ar Sint Eustatius</i> teritorijas.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bosnija ir Hercegovina	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Botsvana	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika vyrauja lapkričio-gegužės/birželio mėn. šiaurinėse šalies teritorijose: <i>Bobirwa, Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: <u>C</u>.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Brazilija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Angolos</i> bei <i>Kongo Demokratinės Respublikos</i>.</p> <p>Pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems, vyresniems nei 9 mėn. amžiaus asmenims, vykstantiems į <i>Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins</i> valstijos ir į kai kurias <i>Piaui, Bahia, Parana, Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul</i> šalies teritorijas ir <i>Iguazu</i> krioklių.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador</i> ir <i>Sao Paulo</i> teritorijas.</p> <p>Maliarija. Didelė rizika (<i>P. vivax</i> – 84 proc.; <i>P. falciparum</i> – 15 proc.) vyrauja visus metus miškingose teritorijose, esančiose žemiau 900 m virš jūros lygio bei 9 <i>Amazon</i> regionuose: <i>Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão (vakarinėje dalyje), Mato Grosso (šiaurinėje dalyje), Pará (išskyrus Belemo miestą), Rondônia, Roraima</i> ir <i>Tocantins</i>. Didžiausia rizika – džiunglių teritorijose, tačiau užsikrėsti galima netgi kai kurių miestų <i>Cruzeiro do Sul, Manaus, Pôrto Velho, Boa Vista, Macapá, Maraba, Rio Branco</i> ir <i>Santarém</i> teritorijose. Maliarijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja: <i>Sao Paulo</i>,</p>

	<p><i>Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: P. vivax teritorijose – B, o P. falciparum teritorijose – C.</u></i></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Britų mergelių salos <i>(Jungtinės Karalystės užjūrio teritorija)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Brunėjaus Darusalamas</p>	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja dėl <i>P. knowlesi</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Bulgarija</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Burkina Faso</p>	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės</p>

	revakcinacija.
Burundis	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Butanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: <i>Chukha, Dagana, Pemagatshel, Samdrup, Jonkhar, Samtse, Sarpang ir Zhemgang</i> teritorijose ištisus metus. Neregistruotas infekcijos perdavimas <i>Bumthang, Gasa, Paro ir Thimphu</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Centrinės Afrikos Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Čadas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , geltonojo drugio sertifikato reikalaujama

	<p>iš visų amžiaus keliautojų atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltono drugio visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i>.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čekijos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čilės Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Dangun Žengimo sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Danija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Dominika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Dominikos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač kai kuriose vakarinės dalies provincijų kaimo vietovėse (<i>Dajabon, Elias Pina ir San Juan</i>). <u>PSO rekomenduojama profilaktika: B.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Dramblio Kaulo Krantas	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
Džibutis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
Egiptas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (įskaitant <i>Eritrea, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania, Zambia</i> teritorijas) bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Labai nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. įskaitant ir <i>El Fajumo</i> teritoriją. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u>

	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų (pvz.: <i>Afganistano, Pakistano</i>) privalo turėti įrodymą (kartu su viza) apie atliktą poliomielioto vakcinaciją (keliautojas per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepijęs OPV ar IPV vakcina).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Ekvadoras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama vyresniems nei 9 mėn. amžiaus asmenims, keliaujantiems į <i>Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios ir Zamora-Chinchi</i> teritorijas.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į: <i>Esmeraldas, Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha and Tungurahua, Guayaquil, Quito teritorijas bei Galápagos salas.</i></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (67 proc.), <i>P. falciparum</i> (33 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Didelė maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Esmeraldos provincijoje, Amazonės regione</i> (ypač <i>Pastaza</i> ir <i>Morano Santiago</i> vietovėse). Rizika dėl <i>P. vivax</i> egzistuoja <i>Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbios</i> teritorijose. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Quito ir Inter-Andea, Sierra</i> regionuose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Eritrėja</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepyti visų keliautojų vykstančių į šias teritorijas kaip: <i>Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel ir Semenawi Keih Bahri, Dahlak Archipelagos.</i></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (35 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (65 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2200 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra <i>Asmara</i> teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Estija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Etiopija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams. Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į <i>Afar ir Somali</i> provincijas.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (40 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (60 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2000 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra <i>Addis Ababa</i> . Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Farerų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Fidžis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Filipinai	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų

	<p>vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 600 m. jūros lygio, tik išskyrus <i>Aklan, Albay, Bilaran, Benguet, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Northern Leyte, Southern Leyte, Masbate, Marinduque, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Siquijor, Sorsogon, Surigao Del Norte</i> provincijas, <i>Manila</i>. Manoma, jog nėra rizikos dideliuose miestuose ir lygumose. Taip pat registruotas <i>P.knowlesi Palawan</i> teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Folklando (Malvinų) salos</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gabonas</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gajanos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</u></p> <p>Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (36 proc.), <i>P. falciparum</i> (53 proc.), abiejų sukėlėjų (11 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Pavienių atvejų buvo registruota tankiai gyvenamose pakrantės teritorijose. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Galapagų salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama vyresniems nei 9 mėn. amžiaus asmenims, keliaujantiems į <i>Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios ir Zamora-Chinchi</i> teritorijas.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į: <i>Esmeraldas, Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha and Tungurahua, Guayaquil, Quito teritorijas bei Galápagos salas.</i></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (67 proc.), <i>P. falciparum</i> (33 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Didelė maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Esmeraldos provincijoje, Amazonės regione</i> (ypač <i>Pastaza</i> ir <i>Morano Santiago</i> vietovėse). Rizika dėl <i>P. vivax</i> egzistuoja <i>Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbios</i> teritorijose. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Quito ir Inter-Andea, Sierra</i> regionuose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gambija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato ir geltonojo drugio skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gana	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies</p>

	<p>teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gibraltaras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Graikija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Egzistuoja labai maža <i>P. vivax</i> rizika nuo gegužės iki spalio mėnesio. Turistų lankomose vietose rizikos nėra. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Grenada	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Grenlandija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gruzija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriuose kaimo vietovėse, esančiuose pietrytinės šalies dalyje besiribojančiuose su <i>Azerbaidžanu</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų ir neesantys pasiskiepiję nuo poliomielioto ar negalintys pateikti sertifikato, įrodančio apie atliktą vakcinaciją, pasienyje bus pasiskiepyti oraline poliomielioto vakcina.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Guamas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gvadelupa	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gvatemala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 1500 m. jūros lygio. Maža infekcijos rizika vyrauja: <i>Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz, San Marcos, Peten, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Santa Rosa, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango, Quiche</i> teritorijose. Didžiausia rizika vyrauja – <i>Gomera, Masagua, Santa Lucia Cotzumalguapa ir Tiquisate, Telemán, Panzos, La Tinta</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: B.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gvinėja	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies</p>

	<p>teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Haitis	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: B arba C,</u> jeigu kelionės metu CHL yra neprieinamas.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Hondūras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (79 proc.), <i>P. falciparum</i> (20 proc.), abiejų sukėlėjų (0,8 proc.) vyrauja visus metus. Ypač didelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> ir <i>P. falciparum</i> kyla šiose teritorijose: <i>Gracias a Dios, Colon, Olancho ir Yoro</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: B.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Honkongas (Specialusis administracinis Kinijos regionas)	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Indija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų. Asmenys (išskyrus kūdikius iki 6 mėn.), atvykstantys į Indiją oro ar jūrų transportu nepaėjęs 6 dienoms (vykstantiems jūrų transportu iki 30 dienų) po lankymosi infekuotoje šalyje ar vykę tranzitu per jas ir</p>

	<p>neesantys pasiskiepiję bei neturintys skiepijimo nuo geltonojo drugio sertifikatų, gali būti izoliuojami 6 dienoms pagal Indijoje galiojančias taisykles. Indijoje infekuotomis teritorijomis yra laikomos šios šalys: Afrikoje: <i>Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Kongo Demokratinė Respublika, Pusiaujo Gvinėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Kenija, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Ruanda, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Togas, Uganda, Mauritanija. Amerikoje: <i>Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Ekvadoras, Prancūzijos Gviana, Gviana, Panama, Peru, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela.</i></i></p> <p>Pastaba. Šį sąrašą Indijos vyriausybė gali papildyti, jei pranešama apie geltonojo drugio atvejį, kuris į sąrašą nėra įtrauktas.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum, P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Santykinai didelė rizikos tikimybė vyrauja šiaurės rytinėse teritorijose: <i>Andaman ir Nicobar salos, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka (išskyrus Bangalore miestą), Madhya Pradesh, Maharashtra (išskyrus Mumbai, Nagpur, Nasik ir Pune miestus), Orissa ir Vakarų Bengalas (išskyrus Kolkata miestą).</i> <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Kiti reikalavimai: pasiskiepijimas oraline poliomieliito vakcina reikalaujamas iš keliautojų (4 savaitės iki išvykimo), atvykstančių iš endeminių poliomieliito teritorijų: Afganistano, Nigerijos, Pakistano bei iš šalių, kuriuose registruotas laukinio poliomieliito viruso cirkuliavimas: Etiopijos, Kenijos, Somalio, Sirijos.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Indijos Vandenyno Britų Sritis <i>(Didžiąjai Britanijai priklausanti užjūrio teritorija)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Indonezija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus visoje rytinėje šalies teritorijose: <i>East Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua, West Papua</i>). Maliarijos rizika taip pat vyrauja ir kitose šalies teritorijose, išskyrus: <i>Jakarta</i>, didelius miestus ir turistų lankomas vietas. Pranešama apie registruotus <i>P. knowlesi</i> infekcijos atvejus <i>Kalimantan</i> teritorijoje. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Irakas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja gegužės-lapkričio mėn. šiauriniuose šalies rajonuose, esančiuose žemiau nei 1500 m. jūros lygio (<i>Duhok, Erbil ir Sulaimaniya</i> provincijose). <u>PSO profilaktikos nerekomenduojama.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų, ar vykstančių iš Irako į endemines teritorijas privalo pasiskiepyti oraline poliomielioto vakcina (OPV).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Iranas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> bei maža rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja kovo-lapkričio mėn. <i>Hormozgan, Kerman</i> (tropinėje dalyje) ir <i>Sistan – Baluchestan</i> (pietinėje dalyje) provincijų kaimo vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų, Tarptautiniame skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Islandija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Ispanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Italija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Izraelis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jamaika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Kiti reikalavimai: Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į Jamaiką turistiniais tikslais ne ilgiau nei 30 dienų laikotarpiui, privalo pateikti dokumentą, įrodanti apie atliktus skiepus nuo tymų, raudonukės ir poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Japonija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jemeno Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač rugsėjo-vasario mėn., visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio, išskyrus <i>Sana</i> miestą. Ribota rizika stebima <i>Socotra</i> saloje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C, o <i>Socotra</i> saloje – A.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Jordanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų, Tarptautiniame skiepavimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jungtinė Karalystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jungtinės Amerikos Valstijos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jungtiniai Arabų Emyratai	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Juodkalnija (Montenegro)	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kaimanų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kalėdų sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus <i>Galapagos</i> salas <i>Ekvadore</i> ir <i>Misioneso</i> provinciją <i>Argentinoje</i>.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kambodža</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus, ypač miškingose vietovėse. Taip pat <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vakarinėje Kambodžos dalyje, <i>P. vivax</i> rytinėje šalies dalyje. Infekcijos rizikos nėra šiose teritorijose: <i>Phnom Penh</i> ir <i>Tonle Sap (Siem Reap)</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: D.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kamerūnas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kanada</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Kanarų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kataras	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.
Kazachstanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
Kenija	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
Kinija	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams.
	Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į Šiaurės rytų provinciją: <i>Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi, Tanariver Coastal</i> provinciją, <i>Nairobi</i> ir <i>Mombasa</i> miestus.
Kinija	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Nedidelė maliarijos rizika vyrauja Nairobyje ir teritorijose, esančiose aukščiau nei 2500 m. jūros lygio (Centrinėse, Rytinėse, Vakarinėse ir <i>Nyanza, Rift Valley</i> provincijose). <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kinija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Šis reikalavimas netaikomas keliautojams, kurie vyksta tik į <i>Hong Kong</i> ir <i>Macao</i> teritorijas.</p>
	<p>Maliarija. Kinijoje daugiausiai (98 proc.) registruojami tik įvežtiniai maliarijos atvejai iš maliarijos endeminių teritorijų. Nedidelė rizika vyrauja kai kuriose šalies teritorijose: <i>Yunnan</i> provincijoje, kuri ribojasi su <i>Mianmaru</i> bei <i>Tibete</i>. Taip pat nedidelė maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Yunnan</i> provincijoje, kuriame egzistuoja atsparumas antimaliariniais vaistams. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A (išskyrus <i>Yunnan</i> provinciją, kurioje rekomenduojama profilaktika – C).</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kipras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kirgizija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriose pietinėse ir vakarinėse šalies teritorijose ties pasieniu su <i>Tadžikistanu</i> ir <i>Uzbekistanu</i> (<i>Batken</i>, <i>Jalal-Abad</i> ir <i>Osh</i> regionai) ir <i>Bishkek</i> pakraščiuose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kiribatis</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<p>Kiurasao (<i>Sala Karibų jūros pietuose</i>)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kolumbija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p> <p>Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į vietas esančias aukščiau 2300 m. virš jūros lygio, keliaujantiems į <i>Bogota</i> ir į <i>San Andrés y Providencia</i> taip pat <i>Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin</i> teritorijas.</p>
	<p>Maliarija. Didelė infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: <i>Antioquia, Bolivar, Cauca, Choco, Cordoba, Guajira, Narino</i> ir <i>Risaralda</i> teritorijose. Nedidelė rizika vyrauja keliaujant į <i>Amazonas, Caqueta, Guaviare, Guainia, Meta, Putumayo, Vaupes</i>, ir <i>Vichada</i>. Taip pat šalyje yra registruojami sukėlėjo <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui, sulfadoxinui /pirimetaminui. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>	
<p>Komorų Sąjunga</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kongo Demokratinė Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kongo Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose pietinėse šalies teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Korėjos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose šiaurinėse šalies teritorijose, dažniausiai <i>Gangwon-do</i> ir <i>Gyeonggi-do</i> provincijų teritorijose bei <i>Incheon</i> mieste. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kosta Rika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (įskaitant <i>Eritrea, Sao Tome, principė, Somalia, Tanzania, Zambia, Africa</i> (išskyrus <i>Argentina</i>,</p>

	<p><i>Guyana, Panama, Paraguay, Suriname Amerikoje).</i></p> <p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja šalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p> <p>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų): hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kroatija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuba	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuko salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuveitas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Laoso Liaudies Demokratinė Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus <i>Vientiane</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Latvija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Lenkija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Lesotas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Libano Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai vykstantys/atvykstantys į/iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Liberija	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Libija	Yra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai vykstantys į šią šalį turi pasiskiepyti nuo meningokokinės infekcijos. Taip pat visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų (pvz.: Afganistano, Pakistano) privalo turėti įrodymą (kartu su viza) apie atliktą poliomielioto vakcinaciją (keliautojas per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepijęs OPV ar IPV vakcina).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Lichtenšteinas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Lietuva</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš šalių, kuriose dar registruojami poliomielioto atvejai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomielioto OPV vakcina.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Liuksemburgas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Madagaskaras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, ypač pakrančių teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai, kurie šalyje praleidžia ilgiau nei 28 dienas, privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto.</p>

	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Madeira <i>(Portugalija)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Majotas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Makedonija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Malaizija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Šalyje yra riboti maži maliarijos židiniai atokiose vietovėse (<i>Sabah, Sarawak</i> ir <i>Peninsular</i>). Rizikos nėra miestuose ir pakrantės teritorijose. Pranešama apie registruotus infekcijos atvejus dėl <i>P. knowlesi</i> sukėlėjo. Taip pat registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Malavis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų

	<p>amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Maldivai	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai vykstantys/atvykstantys į/iš endeminių poliomielioto teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Malis	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i>.</p> <p>Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Malta	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Jei yra</p>

	<p>būtina, jaunesni nei 9 mėn. kūdikiai, atvykstantys iš infekuotų geltonojo drugio teritorijų, gali būti izoliuojami ar stebimi.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Marianos šiaurinių salų sandrauga	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Marokas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų, Tarptautiniame skiepavimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Maršalo salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Martinika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mauricijus	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių</p>

	šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Mauritanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i> . Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i> .
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje išskyrus šiaurines teritorijas: <i>Dakhlet - Nouadhibou</i> ir <i>Tiris - Zemour</i> . Liepos - spalio mėn. (liūčių laikotarpiu) maliarijos rizika vyrauja <i>Adrar</i> ir <i>Inchiri</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Meksika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, retai lankomose turistų. Nedidelė infekcijos rizika vyrauja <i>Chiapas State (Costa)</i> teritorijoje. Tokiose šalies teritorijose kaip: <i>Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo</i> maliarijos rizika labai maža. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u>
Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.	
Mergelių salos <i>(Jungtinės Amerikos Valstijos)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Mianmaras <i>(anksčiau Birma)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Nuolatiniais <i>Mianmaro</i> gyventojams bei rezidentams (laikiniams gyventojams)

	<p>vykstantiems į geltonojo drugio infekuotas teritorijas reikia pateikti skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikatą.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo, miškingose, kalnuotose ir pakrančių teritorijose <i>Rahkine State</i>. Registruotas atsparumas MEF <i>Kayin State</i> ir rytinėje <i>Shan State</i> teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. Šalyje registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C, o pietryčių Mianmare: D.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mikronezijos Federacinės Valstijos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Moldovos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Monakas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mongolija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Monseratas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mozambikas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus šias teritorijas: <i>South Sudan, São Tomé ir Príncipe, Somalia, United Republic of Tanzania in Africa; Argentina, French Guiana, Paraguay in South America</i>) bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją (išskyrus prieš tai minėtas teritorijas).</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Namibija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio - birželio mėn. <i>Ohangwena, Otjozondjupa, Oshana, Oshikoto, Omusati, Omaheke</i> rajonuose ir visus metus prie <i>Kunene</i> upės (<i>Kunene regione</i>), <i>Zambesi</i> upės (<i>Zambesi regione</i>) <i>Okavango</i> upės (<i>Kavango regione</i>). <u>PSO rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C.</u></p>
<p>Naujoji Kaledonija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Pastaba. Jei šalyje kiltų epidemijos pavojus, gali būti reikalaujama specialaus vakcinacijos sertifikato.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Naujoji Zelandija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Nauru	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Nepalas	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, ypač 20-yje <i>Terai</i> pasienio rajonuose ties siena su Indija bei tarp kalvų. Infekcijos protrūkiai dėl <i>P. falciparum</i> būdingi ypač liepos – spalio mėn. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys į šią šalį turi būti pasiskiepiję nuo poliomielito.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Nigerija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat keliautojams vykstantiems į šią šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Nigeris	Yra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato ir skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų atvykstančių ir išvykstančių iš Nigerio.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis tiems keliautojams, kurie keliaus tik po Sacharos dykumą.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Nikaragva</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (82 proc.) vyrauja visus metus didesnėje šalies teritorijose: <i>Autónoma del Atlántico Norte</i> regionuose, <i>Boaca</i>, <i>Chinandega</i>, <i>Jinoteca</i>, <i>Léon</i> ir <i>Matagalpa</i>. Maža rizika centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: B.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Niujė (Naujoji Zelandija)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Nyderlandai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Norfolko sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus <i>Galapagos</i> salas <i>Ekvadore</i> ir <i>Misioneso</i> provinciją <i>Argentinoje</i>.</p>

	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Norvegija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Omanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. 2010 m. buvo registruoti vietiniai <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> protrūkiai Ash Sharqiyah North Governorate teritorijoje. <u>PSO profilaktika nerekomenduojama.</u>
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Pakistanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 2000 m. jūros lygio, liepos – gruodžio mėn. kaimo vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai išvykstantys ir atvykę (pvz.: >4 savaitėms) į šalį privalo turėti įrodymą (Tarptautiniame skiepavimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime) apie atliktą poliomielioto (OPV) vakcinaciją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Palau	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Panama	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į rytus nuo <i>Panamos Kanalo zonos (Comarcas of Emberá ir Kuna Yala, Darién ir Colón</i> provincija).</p> <p>Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama vykstantiems į vakarus nuo <i>Panamos Kanalo zonos</i>, pačioje <i>Panamos kanalo</i> teritorijoje, <i>Panamos</i> mieste, <i>Balbao</i> ir <i>San Blas salose</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (>99 proc.) vyrauja visus metus provincijose prie <i>Atlanto</i> krantų ir ties siena su <i>Kosta Rika</i> ir <i>Kolumbija: Bocas del Toro, Chiriqui, Colon, Darien, Ngobe Bugle, Panama</i> ir <i>Veraguas</i>. <i>Panamos</i> mieste, <i>Kanalo</i> zonoje ir kitose provincijose rizika maža arba visai nėra. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: rizikos teritorijose – B, rytinėse šalies endeminėse teritorijose besiribojančiose su Kolumbija: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Papua - Naujoji Gvinėja	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 1800 m. jūros lygio. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Paragvajus	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis asmenims vykstantiems į <i>Asuncion</i> miestą.</p>

	<p>Maliarija. Vyrauja vidutinė <i>P. vivax</i> rizika kai kuriose šalies teritorijose (<i>Alto Parana, Canindeyu, ir Caaguazu</i>). <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Peru</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į šalies rizikos teritorijas (miškingas teritorijas, džiungles, esančias žemiau kaip 2300 m virš jūros lygio): <i>Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno, Cuzco; Junín, Pasco ir Huánuco, Apurimac</i>; šiaurės <i>Huancavelica</i>; šiaurės rytai <i>Ancash</i>; rytų <i>La Libertad</i>; šiaurės ir rytų <i>Cajamarca</i>; šiaurės ir šiaurės rytų <i>Ayacucho</i> ir rytų <i>Piura</i>. Vykstantiems tik į <i>Andes, Cuzco miestą, Limą, Machu Picchu, Inca</i> teritorijas skiepytis nerekomenduojama.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (84 proc.), <i>P. falciparum</i> (16 proc.) vyrauja visus metus kaimo teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Rizikos teritorijos yra <i>Ayacucho, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Piura ir Tumbes</i>. 98 proc. <i>P. falciparum</i> atvejų buvo registruoti <i>Loreto</i> apskrityje, šalia Amazonės. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika <i>P. vivax</i> rizikos teritorijose: B; Loreto apskrities teritorijose - C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Pietų Afrikos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose <i>Mpumalango</i> provincijose (įskaitant <i>Kruger</i> Nacionalinį parką), Šiaurės provincijose ir šalies šiaurės rytinės dalies <i>KwaZulu-Natal</i> srityje. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja spalio-gegužės mėn. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Pietų Sudanas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl pasiskiepyti nuo geltonojo drugio</p>

	<p><u>rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Pitkerno sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Portugalija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Prancūzija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Prancūzijos Gviana	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Didelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (45 proc.), <i>P. vivax</i> (55 proc.) vyrauja visus metus teritorijose, besiribojančiose su Brazilija (<i>Oiapoque river valley</i>) ir Surinamu (<i>Maroni river valley</i>). 13 apskričių teritorijose, infekcijos rizika maža. Taip pat kur vyksta migracija iš Brazilijos yra registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas daugumai antimaliarinių vaistų. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Prancūzijos Polinezija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Puerto Rikas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Pusiaujo Gvinėja	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
Rejunjonas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Rytų Timoro Demokratinė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų

Respublika	vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Ruanda	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Rumunija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Rusija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Labai ribota infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> tose rajonuose, kuriuose didelė migracija iš pietų šalių. <u>PSO profilaktikos nerekomenduoja.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Salamono salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, išskyrus kai kurias rytines ir pietines saleles. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Salvadoras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Labai maža infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kaimiškose vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
Samoa	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
San Marinas	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
San Tomė ir Prinsipė	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
Saudo Arabija	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Didžiausia infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugsėjo-sausio mėn. visose šalies teritorijose, įskaitant pietinę sieną su <i>Yemen</i>. Maliarijos rizikos nėra <i>Mecca</i> ir <i>Medina</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai, vykstantys į <i>Umrah</i> ir <i>Hajj</i> teritorijas, turi pateikti galiojantį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135) nuo meningokokinės infekcijos (ne anksčiau kaip 10 dienų iki išvykimo ir ne vėliau kaip 3 metai iki atvykimo į Saudo Arabiją).</p> <p>Taip pat visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją (bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepiję). Visi keliautojai, atvykę į <i>Saudo Arabiją</i> ir nepriklausomai nuo amžiaus ir skiepijimo būklės šalies pasienyje bus paskiepyti 1 OPV doze.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Seišeliai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojams, atvykstantiems iš šalių, kuriose dar registruojami poliomielioto protrūkiai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomielioto.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Sen Pjeras ir Mikelonas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Senegalas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>

	<p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Mažesnė infekcijos rizika vyrauja sausio-birželio mėn. tik Centrinuose vakarų regionuose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sent Kristoferio ir Nevio Federacija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš šalių, kuriose dar registruojami poliomieliato atvejai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomieliato (OPV).</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sent Lusija (Sala ir valstybė Mažuosiuose Antiluose)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Serbija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Siera Leonė</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Singapūras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų arba per paskutines 6 dienas buvusių bei vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Vyrauja infekcijos rizika dėl <i>P. knowlesi</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sint Martenas (<i>San Marteno salos pietinė dalis</i>)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sirijos Arabų Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> yra ribota, ir vyrauja gegužės-spalio mėn. ties šiaurine šalies siena, ypač šiaurės rytinėje dalyje ir <i>El Hasaka Governorate</i> kaimo vietovėse (maliarijos atvejų neregistruota nuo 2005 m.). <u>PSO profilaktikos nekomenduoja.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai, atvykstantys iš <i>Kamerūno, Pusiaujo Gvinėjos, Pakistano</i>, bei keliautojai vykstantys iš <i>Sirijos Arabų Respublikos</i> į kitas šalis privalo būti pasiskiepiję nuo poliomielito.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Slovakija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Slovėnija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Somalis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į šiuos regionus: <i>Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle ir Middle Shabelle.</i>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja Centrinėje ir Pietinėje šalies dalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Sudanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat geltonojo drugio sertifikato gali reikalauti keliautojų išvykstančių iš Sudano. Pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik <i>Sacharos dykumoje</i> ir į <i>Khartoum miestą</i> .
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Labai maža rizika vyrauja šalies šiaurėje, Raudonosios jūros pakrantėje, didesnė rizika – centrinėje bei pietinėje šalies dalyje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Suomija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Surinamas	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (40 proc.), <i>P. vivax</i> (58 proc.), abiejų kombinacija 2 proc. vyrauja visus metus centrinėje šalies dalyje, kalnuotose savanos vietovėse. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja ties rytine šalies siena ir aukso kasybos rajonuose. Labai nedidelė rizika – <i>Paramaribo</i> mieste bei kitose pakrantės vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Svazilandas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose žemumose, ypač <i>Big Bende, Mhlume, Simunye ir Tshaneni</i>. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja lapkričio – gegužės mėn. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šri Lanka	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto ir keliaujantys į endemines poliomielioto teritorijas, privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Šv. Bartolomėjaus sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šv. Elenos sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šv. Martyno sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šv. Vincentas ir Grenadinai	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Švedija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šveicarija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tadžikistanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. ties pietine šalies siena (<i>Khatlon regionas</i>), kai kuriose centrinėse (<i>Dushanbe</i>), vakarinėse (<i>Gorno-Badakhshan</i>) ir šiaurinėse (<i>Leninabad regionas</i>) šalies teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: rizikingose teritorijose dėl <i>P. vivax</i> - B, o pietinėje šalies dalyje arčiau <i>Afganistano</i> sienos: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tailandas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus kaimo teritorijose, ypač – miškingose, kalnuotose vietovėse, taip pat šalies pasienyje. Infekcijos rizikos nėra didžiuosiuose miestuose (<i>Bangkok, Chiang Mai city, Pattaya</i> ir kituose miestuose), <i>Samui ir Phuket salose</i>. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas MEF, kai kuriose teritorijose ties šalies siena su <i>Cambodia</i> ir <i>Myanmar</i>, o <i>P. vivax</i> atsparumas – CHL; Taip pat registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: rizikingose teritorijose A, o prie <i>Cambodia</i> ir <i>Myanmar</i> sienų: D.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tanzanija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 1800 m jūros lygio. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Terksas ir Kaikosas <i>(Jungtinės Karalystės užjūrio teritorija)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Togo Respublika	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tokelau	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tongos Karalystė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Trinidadas ir Tobagas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, į kurių maršrutą yra įtrauktas <i>Trinidadas</i> . Keliaujantiems kruiziniais laivais ar oro transportu tik į <i>Tobagą</i> - skiepytis nebūtina.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tristanas da Kunja	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn.

	<p>amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tunisas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Turkija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Turkmėnistanas <i>(Turkmėnija)</i>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tuvalu	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Uganda	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Ukraina	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Urugvajus	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Uzbekistanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Pavieniai infekcijos atvejai dėl <i>P. vivax</i> buvo registruoti kai kuriuose pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, besiribojančiuose su <i>Afganistanu, Kirgizija ir Tadžikistanu</i>. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vanuatu	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Maža ar vidutinė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Veiko sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Venesuela	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Brazilijos</i> bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams.</p> <p>Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas ir Yaracuy, Distrito Federal</i> valstijas. Taip pat vykstant į teritorijas esančias aukščiau nei 2300 m. aukštyje: <i>Trujillo, Merida, ir Tachira; Falcon ir Lara;</i></p>

	<p><i>Margaritos Sala; Caracas; Valencia.</i></p> <p>Maliarija. Didelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (75 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (25 proc.) vyrauja visus metus kai kurių rajonų (<i>Amazonas, Anzoategui, Bolívar, Delta Amacura</i>) kaimo vietovėse. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Apure, Monagas, Sucre ir Zulia</i> vietovėse. Dažniausia <i>P. falciparum</i> rizika - <i>Amazono (Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare) ir Bolívar (Angostura, Cedeno, Ell Callao, Heres, Gran Sabana, Piar, Rocio, Sifontes), ir Sucre (Benitez, Bermudez, Cajigal y Arismendi)</i> džunglių teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL, sulfadoksinui – pirimetaminui. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: <i>P.vivax</i> rizikos teritorijose - B, <i>P. falciparum</i> rizikos teritorijose C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vengrija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vietnamas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus išskyrus miesto centrus: <i>Red River delta, Mekong delta</i> bei pakrantės lygumą <i>Centriniam Vietname</i>. Didžiausia infekcijos rizika yra kalnuotose vietovėse žemiau nei 1500 m. jūros lygio 18°N į pietus esančiose teritorijose, ypač – <i>Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai ir Kon Tum, Binh Phuoc provincijose</i> bei vakarinėse <i>Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam and Quang Tri pakrantės</i> vietovėse. Taip pat yra registruotas atsparumas MEF. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vokietija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Volisas ir Futūna	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

<p>(Prancūzijai priklausanti užjūrio teritorija)</p>	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Zambija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat skiepytis nuo geltonojo drugio paprastai nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į <i>Šiaurės Vakarų ir Vakarų provincijas</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Zimbabvė</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio – birželio mėn. teritorijose, esančiose žemiau nei 1200 m. jūros lygio ir visus metus <i>Zambezi žemumoje</i>. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Harare</i> ir <i>Bulawayo</i> rajonuose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B., vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Žaliojo Kyšulio Respublika <i>(Cabo Verde)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugpjūčio-lapkričio</p>

	mėn., įskaitant <i>Santiago salą</i> ir <i>Boa Vista salą</i> . <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Informacija apie skiepėjimus keliautojams teikiama Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre Nugalėtojų g. 14D, Vilnius.

Tel. 8 5 2300124 arba +370 638 53979;

El. paštas: keliautojams@ulac.lt;

Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje: www.ulac.lt; <http://www.ulac.lt/lt/keliautojams> .

Informacijos šaltiniai:

1. Countries with risk of yellow fever transmission and countries requiring yellow fever vaccination. *World Health Organization*. Geneva, February 16, 2017. [<http://www.who.int/ith/2017-ith-annex1.pdf?ua=1>].
2. International travel and health. *World Health Organization*. [<http://www.who.int/ith/en/>].
3. Vaccination requirements and recommendations for international travellers, including yellow fever and malaria (List of countries, territories and areas). *World Health Organization*. Geneva, February 16, 2017. [<http://www.who.int/ith/2017-ith-country-list.pdf?ua=1>].
4. Yellow fever & Malaria information , by country. CDC Health Information for International Travel (Yellow Book). *Centers for Disease Control and Prevention*. USA, December 20, 2016. [<https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever-malaria-information-by-country>].