

ĮVAIRIŲ ŠALIŲ, TERITORIJŲ IR VIETŲVIŲ SĄRAŠAS

(Keliautojams būtinų/rekomenduojamų skiepų, taip pat geltonojo drugio ir maliarijos prevencinių priemonių rekomendacijos pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, 2018 m. birželio 14 d.)

2 lentelė. Imunoprofilaktikos, antimaliarinių vaistų reikalavimai bei rekomendacijos pagal įvairias pasaulio šalis (teritorijas, vietas).

Afganistanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš infekuotų geltonojo drugio teritorijų.
	Maliarija. <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> rizika užsikrėsti vyrauja gegužės - lapkričio mėn. teritorijose, esančiose žemiau 2000 m virš jūros lygio. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Kiti reikalavimai: keliautojai atvykstantys iš Nigerijos privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, poliomielite, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Airija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Albanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Alžyras	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika labai maža. Registruojami tik įvežtiniai atvejai, o paskutinis vietinis atvejis registruotas 2014 m. PSO profilaktikos nerekomenduoja.

	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Amerikos Samoa <i>(JAV užjūrio teritorija)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Andora	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Angilija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Angola	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika užsikrėsti vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Antigva ir Barbuda	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Argentina	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo

	<p>reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų vykstančių į <i>Misiones</i> ir <i>Corrientes</i> teritorijas.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į <i>Formosa</i>, <i>Chaco</i>, <i>Jujuy</i> ir <i>Salto</i> provincijas.</p>
	<p>Maliarija. Nuo 2011 m. vietiniai infekcijos atvejai neregistruoti. Nedidelė <i>P. vivax</i> rizika vyrauja tik <i>Salta</i> bei <i>Corrientes</i> ir <i>Misiones</i> provincijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Armėnija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Aruba	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Australija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus <i>Galapagos</i> salas <i>Ekvadore</i> ir <i>Misioneso</i> provinciją <i>Argentinoje</i>.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Austrija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Azerbaidžanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. <i>P. vivax</i> nedidelė rizika vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriose žemose vietovėse, ypač tarp <i>Kuros</i> ir <i>Arakso</i> upių. Rizikos nėra <i>Baku</i> mieste (sostinėje). Nuo 2013 m. vietiniai infekcijos atvejai neregistruoti. PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Azorų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bahamos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bahreinas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Baltarusija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bangladešas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus. Didelė rizika užsikrėsti <i>Chittagong Hill Tract</i> teritorijose (<i>Bandarban, Rangamati ir Khagrachari</i>), <i>Chittagong</i> ir <i>Cox Bazaar</i> teritorijose. Infekcijos rizika maža yra <i>Hobigonj, Kurigram, Moulvibazar, Mymensingh, Netrakona, Sherpur, Sunamgonj</i> ir <i>Sylhet</i> teritorijose. <i>Dakos</i> mieste maliarijos rizikos nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Barbadosas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus atvykstant iš <i>Gajanos, Trinidado</i>).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Belgija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Belizas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose <i>Stan Creek</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų (įskaitant Belizą ar gyvenančius Belize) privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.</p>
<p>Beninas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus</p>

	<p>keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per geltonojo drugio infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bermudų salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bisau Gvinėja	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bolivija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</u></p> <p>Taip pat visiems, vyresniems nei 9 mėn. amžiaus asmenims, vykstantiems į <i>Beni, Pando</i> ir <i>Santa Cruz</i>, ir kai kurias <i>Chuquisaca, Cochabamba, La Paz</i> ir <i>Tarija</i> teritorijas rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į teritorijas 2300 m. virš jūros lygio ir į aukščiau nepaminėtas teritorijas.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia rizika <i>P. vivax</i> (99.9 proc.) vyrauja visus metus visoje šalyje. Didžiausia maliarijos rizika vyrauja <i>Beni</i> ir <i>Pando</i>, ypač <i>Guayaramerin, Riberalta, Sena</i> vietovėse. PSO rekomenduojama profilaktika: B.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Boneras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Bosnija ir Hercegovina	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Botsvana	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika vyrauja lapkričio-gegužės/birželio mėn. šiaurinėse šalies teritorijose: <i>Bobirwa, Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Brazilija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į <i>Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo State, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins valstijos, Piaui, Bahia, Parana, Sao Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro State, Rio Grande do Sul</i> šalies teritorijas ir Iguazu krioklių.</p> <p>Nuo 2018 m. sausio 16 d. keliautojams nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vykstantiems į <i>Acajutiba, Agua Fria, Aiquara, Alagoinhas, Alcobasa, Almadina, Amargosa, Amelia Rodrigues, Anage, Anguera, Antonio Cardoso, Apora, Apuarema, Aracas, Aracatu, Aramari, Arataca, Aratuipe, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Chosa, Barra do Rocha, Barro Preto, Barrocas, Belmonte, Belo Campo, Biritinga, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Serra, Breoes,</i></p>

Buerarema, Caatiba, Cabaceiras do Paraguacu, Cachoeira, Caetanos, Cairu, Camacan, Camacari, Camamu, Canavieiras, Candeal, Candeias, Candido Sales, Caraibas, Caravelas, Cardeal da Silva, Castro Alves, Catu, Coaraci, Conceicada Feira, Conceicado Almeida, Conceicado Jacuipe, Conde, CondeUba, Contendas do Sincora, Coracade Maria, Cordeiros, Cravolandia, Cruz das Almas, Dario Meira, Dias d'Avila, Dom Macedo Costa, Elisio Medrado, Encruzilhada, Entre Rios, Esplanada, Eunapolis, Feira de Santana, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Guaratinga, Iacu, Ibicarai, Ibicui, Ibirapitanga, Ibirapua, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, Ilheus, Inhambupe, Ipecaeta, Ipiaui, Ipira, Irajuba, Iramaia, Irara, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacare, Itagi, Itagiba, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajupe, Itamaraju, Itamari, Itambe, Itanagra, Itanhem, Itaparica, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itirucu, Itororo, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitauna, Jucurusu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Laje, Lajedao, Lajedo do Tabocal, Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Almeida, Macarani, Madre de Deus, Maetinga, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracas, Maragogipe, Marau, Marcionilio Souza, Mascote, Mata de Sao Joao, Medeiros Neto, Milagres, Mirante, Mortugaba, Mucuri, Muniz Ferreira, Muritiba, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nova Canaa, Nova Ibia, Nova Itarana, Nova Visosa, Ouricangas, Pau Brasil, Pedrao, Pindai, Pirai do Norte, Piripa, Planaltino, Planalto, Pojuca, Porto Seguro, Posoes, Potiragua, Prado, Presidente Janio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachao do Jacuipe, Ribeirao do Largo, Rio Real, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Barbara, Santa Cruz Cabralia, Santa Cruz da Vitoria, Santa Ines, Santa Luzia, Santa Teresinha, Santanopolis, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Santo Estevao, Sao Felipe, Sao Felix, Sao Francisco do Conde, Sao Goncalo dos Campos, São Jose da Vitoria, Sao Miguel das Matas, Sao Sebastiao do Passe, Sapeacu, Saubara, Sebastiao Laranjeiras, Serra Preta, Serrinha, Simoes Filho, Tanhacu, Tanquinho, Taperoa, Teixeira de Freitas, Teodoro Sampaio, Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Tremedal, Ubaira, Ubaitaba, Ubata, Una, Urandi, Urusuca, Valenca, Varzedo, Vera Cruz, Vereda, Vitoria da Conquista, and Wenceslau Guimaraes.

Maliarija. Didelė rizika (*P. vivax* – 88,8 proc.; *P. falciparum* – 10,6 proc.) vyrauja visus metus miškingose teritorijose, esančiose žemiau 900 m virš jūros lygio bei 9 Amazon regionuose: *Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão* (vakarinėje dalyje), *Mato Grosso* (šiaurinėje dalyje), *Pará* (išskyrus Belemo miestą), *Rondonia, Roraima* ir *Tocantins*. Didžiausia rizika – džiunglių teritorijose, tačiau užsikrėsti galima netgi kai kurių miestų *Cruzeiro do Sul, Manaus, Pôrto Velho, Boa Vista, Macapá, Maraba, Rio Branco* ir *Santarém* teritorijose. Maliarijos rizika dėl *P. vivax* vyrauja: *Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo* teritorijose. [PSO rekomenduojama profilaktika: *P. vivax* teritorijose – B, o *P. falciparum* teritorijose – C.](#)

Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Britų mergelių salos

(Jungtinės Karalystės užjūrio teritorija)

Nėra privalomų skiepų keliautojams.

Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Brunėjaus Darusalamas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja dėl <i>P. knowlesi</i> . PSO rekomenduojama profilaktika: B.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Bulgarija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Burkina Faso	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
Burundis	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Butanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: <i>Chukha, Dagana, Pemagatshel, Samdrup, Jonkhar, Samtse, Sarpang ir Zhemgang</i> teritorijose ištisus metus. Neregistruotas infekcijos perdavimas <i>Bumthang, Gasa, Paro ir Thimphu</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Centrinės Afrikos Respublika	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čadas	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių nei 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p> <p>Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltono drugio visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i>.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Čekijos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Čilės Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Dangun Žengimo sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Danija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Dominika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Dominikos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač kai kuriose vakarinės dalies provincijų kaimo vietovėse (<i>Dajabon, Elias Pina ir San Juan</i>). PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Dramblio Kaulo Krantas	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir</u>

	<p><u>geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Džibutis</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Egiptas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (įskaitant <i>Eritrea, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania, Zambia</i> teritorijas) bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Jei keliautojas neturi skiepavimo pažymėjimo, tuomet iki 6 dienų iki išvykimo bus sulaikytas karantine.</p> <p>Maliarija. Labai nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. įskaitant ir <i>El Fajumo</i> teritoriją. Nuo 1998 m. neregistruotas nei vienas infekcijos atvejis. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u></p> <p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų (pvz.: <i>Afganistano, Pakistano, Nigerijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Sirijos</i>) privalo turėti įrodymą (kartu su viza) apie atliktą poliomielite vakcinaciją (keliautojas per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepijęs OPV ar IPV vakcina).</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Ekvadoras	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Keliautojams, vyresniems nei 9 mėn. amžiaus, skiepytis nuo geltonojo drugio rekomenduojama vykstantiems į: <i>Esmeraldas, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios, Zamora-Chinchipe</i>.</p> <p><i>Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua and Zamora-Chinchipe.</i></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (67 proc.), <i>P. falciparum</i> (33 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Esmeraldos provincijoje, Amazonės regione</i> (ypač <i>Pastaza</i> ir <i>Morano Santiago</i> vietovėse). Rizika dėl <i>P. vivax</i> egzistuoja <i>Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbios</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Eritrėja	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepyti visų keliautojų vykstančių į šias teritorijas kaip: <i>Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel ir Semenawi Keih Bahri, Dahlak Archipelagos</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (35 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (65 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2200 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra <i>Asmara</i> teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
Estija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Etiopija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams. Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į <i>Afar ir Somali</i> provincijas.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (40 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (60 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2000 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra <i>Addis Ababa</i>. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
Farerų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Fidžis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Filipinai	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 600 m. jūros lygio, tik išskyrus <i>Aklan, Albay, Bilaran, Benguet, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Northern Leyte, Southern Leyte, Masbate, Marinduque, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Siquijor, Sorsogon, Surigao Del Norte</i> provincijas, <i>Manila</i>. Manoma, jog nėra rizikos dideliuose miestuose</p>

	<p>ir lygumose. Taip pat registruotas <i>P.knowlesi Palawan</i> teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Folklando (Malvinų) salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gabonas	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gajanos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (36 proc.), <i>P. falciparum</i> (53 proc.), abiejų sukėlėjų (11 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Paviinių atvejų buvo registruota tankiai gyvenamose pakrantės teritorijose. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Galapagų salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų</p>

	<p>amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Keliautojams, vyresniems nei 9 mėn. amžiaus, skiepytis nuo geltonojo drugio rekomenduojama vykstantiems į: <i>Esmeraldas, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios, Zamora-Chinchi</i>.</p> <p><i>Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua and Zamora-Chinchi</i>.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (67 proc.), <i>P. falciparum</i> (33 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Esmeraldos provincijoje, Amazonės regione</i> (ypač <i>Pastaza</i> ir <i>Morano Santiago</i> vietovėse). Rizika dėl <i>P. vivax</i> egzistuoja <i>Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbios</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gambija</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato ir geltonojo drugio skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojai turi būti pasiskiepiję nuo meningokokinės infekcijos.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Gana</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>

	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Gibraltaras	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Graikija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Egzistuoja labai maža <i>P. vivax</i> rizika nuo gegužės iki spalio mėnesio. Turistų lankomose vietose rizikos nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Grenada	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Grenlandija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Guamas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Gvadelupa	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gvatemala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 1500 m. jūros lygio. Maža infekcijos rizika vyrauja: <i>Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz, San Marcos, Peten, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Santa Rosa, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango, Quiche</i> teritorijose. Didžiausia rizika vyrauja – <i>Gomera, Masagua, Santa Lucia Cotzumalguapa ir Tiquisate, Telemán, Panzos, La Tinta</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: B.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gvinėja	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Haitis	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B,</p>

	<p>suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Hondūras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (79 proc.), <i>P. falciparum</i> (20 proc.), abiejų sukėlėjų (0,8 proc.) vyrauja visus metus. Ypač didelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> ir <i>P. falciparum</i> kyla šiose teritorijose: <i>Gracias a Dios, Colon, Olancho ir Yoro</i> teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: P. vivax rizikos teritorijose B, P. falciparum teritorijose – C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Indija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų. Asmenys (išskyrus kūdikius iki 9 mėn.), atvykstantys į Indiją oro ar jūrų transportu nepaėjęs 6 dienoms (vykstantiems jūrų transportu iki 30 dienų) po lankymosi infekuotoje šalyje ar vykę tranzitu per jas ir neesantys pasiskiepiję bei neturintys skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikatų, gali būti izoliuojami 6 dienoms pagal Indijoje galiojančias taisykles. Indijoje infekuotomis teritorijomis yra laikomos šios šalys: Afrikoje: <i>Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Kongo Demokratinė Respublika, Pusiaujo Gvinėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Kenija, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Ruanda, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Togas, Uganda, Mauritanija. Amerikoje: <i>Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Ekvadoras, Prancūzijos Gviana, Gviana, Panama, Peru, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela.</i></i></p>
	<p>Pastaba. Ši sąrašą Indijos vyriausybė gali papildyti, jei pranešama apie geltonojo drugio atvejį, kuris į sąrašą nėra įtrauktas.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (40-50 proc.), <i>P. vivax</i> (50-60 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Infekcijos rizikos nėra <i>Himachal Pradesh, Jammu ir Kashmir</i> bei <i>Sikkim</i> teritorijose. Santykinai didelė rizikos tikimybė dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja siaurės rytinėse teritorijose: <i>Andaman ir Nicobar salos, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka</i> (išskyrus <i>Bangalore</i> miestą), <i>Madhya Pradesh, Maharashtra</i> (išskyrus <i>Mumbai, Nagpur, Nasik ir Pune</i> miestus), <i>Orissa</i> ir <i>Vakarų Bengalas</i> (išskyrus <i>Kolkata</i> miestą). PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: pasiskiepijimas oraline poliomielito vakcina reikalaujamas iš keliautojų (4 savaitės iki išvykimo), atvykstančių iš endeminių poliomielito teritorijų:</p>

	<p>Afganistano, Nigerijos, Pakistano bei iš šalių, kuriuose registruoti įvežtiniai laukinio poliomieliito viruso atvejai: Etiopijos, Kenijos, Somalio, Sirijos, Kongo Demokratinės Respublikos.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Indijos Vandenyno Britų Sritis <i>(Didžiąjai Britanijai priklausanti užjūrio teritorija)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
<p>Indonezija</p>	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus visoje rytinėje šalies teritorijose: <i>East Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua, West Papua</i>. Maliarijos rizika taip pat vyrauja ir kitose šalies teritorijose, išskyrus: <i>Jakarta</i>, didelius miestus ir turistų lankomas vietas. Pranešama apie registruotus <i>P. knowlesi</i> infekcijos atvejus <i>Kalimantan</i> teritorijoje. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Irakas</p>	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja gegužės-lapkričio mėn. šiauriniuose šalies rajonuose, esančiuose žemiau nei 1500 m. jūros lygio (<i>Duhok, Erbil ir Sulaimaniya</i> provincijose). PSO profilaktikos nerekomenduojama.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, ar vykstančių iš Irako į endemines teritorijas privalo pasiskiepyti vakcina nuo poliomieliito. Jei keliautojas neturi skiepijimo pažymėjimo, tuomet keliautojas bus paskiepytas viena oraline poliomieliito vakcinos doze.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių</p>

	šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Iranas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> bei maža rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja kovo-lapkričio mėn. <i>Hormozgan, Kerman</i> (tropinėje dalyje) ir <i>Sistan – Baluchestan</i> (pietinėje dalyje) provincijų kaimo vietovėse. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų (Afganistano, Pakistano, Nigerijos), Tarptautiniame skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Islandija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Ispanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Italija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Izraelis	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jamaika	Yra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į Jamaiką turistiniais tikslais ne ilgiau nei 30 dienų laikotarpiui, privalo pateikti dokumentą, įrodanti apie atliktus skiepus nuo tymų, raudonukės ir poliomieliito.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Japonija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jemeno Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač rugsėjo-vasario mėn., visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio, išskyrus <i>Sana</i> miestą. Ribota rizika stebima <i>Socotra</i> saloje. PSO rekomenduojama profilaktika: C, o Socotra saloje – A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jordanija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, Tarptautiniame skiepavimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą vakcinaciją nuo poliomieliito (OPV ar IPV doze).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Jungtinė Karalystė	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės</p>

	revakcinacija.
Jungtinės Amerikos Valstijos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Jungtiniai Arabų Emyratai	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Juodkalnija (Montenegro)	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kaimanų salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kalėdų sala	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus <i>Galapagos</i> salas <i>Ekvadore</i> ir <i>Misioneso</i> provinciją <i>Argentinoje</i> .
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Kambodža	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus, ypač miškingose vietovėse. Taip pat <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vakarinėje Kambodžos dalyje, <i>P. vivax</i> rytinėje šalies dalyje. Infekcijos rizikos nėra šiose teritorijose: <i>Phnom Penh</i> ir <i>Tonle Sap (Siem Reap)</i> . Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas: <i>artesanatui</i> ,

	<p><i>meflokinui, lumefantrinui ir piperakvinui</i> – Vakarų Kambodžoje ir tęsiasi iki šalies centro. <i>P. vivax</i> atsparumas – <i>chlorochinui</i>, pastebėtas Rytų Kambodžoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kamerūnas</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Endeminė šalies teritorija, todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kanada</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kanarų salos</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kazachstanas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kenija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams.</p> <p>Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į</p>

	<p>Šiaurės rytų provincija: <i>Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi, Tanariver Coastal</i> provincija, <i>Nairobi</i> ir <i>Mombasa</i> miestus.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Nedidelė maliarijos rizika vyrauja Nairobyje ir teritorijose, esančiose aukščiau nei 2500 m. jūros lygio (Centrinėse, Rytinėse, Vakarinėse ir <i>Nyanza, Rift Valley</i> provincijose). PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kinija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Šis reikalavimas netaikomas keliautojams, kurie vyksta tik į <i>Hong Kong</i> ir <i>Macao</i> teritorijas.</p> <p>Maliarija. Kinijoje daugiausiai (98 proc.) registruojami tik įvežtiniai maliarijos atvejai iš maliarijos endeminių teritorijų. Nedidelė rizika vyrauja kai kuriose šalies teritorijose: <i>Yunnan</i> provincijoje, kuri ribojasi su <i>Mianmaru</i> bei <i>Tibete</i>. Taip pat nedidelė maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Yunnan</i> provincijoje, kuriame egzistuoja atsparumas antimaliariniais vaistams. PSO rekomenduojama profilaktika: A (išskyrus <i>Yunnan</i> provinciją, kurioje rekomenduojama profilaktika – C).</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kipras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Kirgizijos Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<p style="text-align: center;">Kiribatis</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Kiurasao <i>(Sala Karibų jūros pietuose)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Kolumbija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų ir Angolos, Brazilijos, Kongo demokratinės Respublikos, Ugandos bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p> <p>Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į vietas esančias aukščiau 2300 m. virš jūros lygio, keliaujantiems į <i>Bogota</i> ir į <i>San Andrés y Providencia</i> taip pat <i>Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín</i> teritorijas.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja: <i>Antioquia (El Bagre, Vigía del Fuerte, Segovia, Tarazá, Zaragoza, Cáceres, Nechí, Murindó, Anorí, Remedios, Mutatá, Frontino, San Pedro de Urabá, Dabeiba, Valdivia, and Caucasia), Amazonas (Tarapacá, La Pedrera, Puerto Nariño, Leticia, Miriti-Paraná, and La Chorrera), Bolívar (Montecristo, Norosi, Tiquisio and San Pablo), Cauca (Timbiquí), Chocó (Bagadó, Nóvita, Lloró, Tadó, Río Quito, El Cantón del San Pablo, Río Iro, Atrato, Bojaya, San José del Palmar, Quibdó, Bajo Baudó, Medio San Juan, Carmen de Darien, Nuquí, Medio Baudó, Alto Baudó, Istmina, Bahía Solano, Medio Atrato, Juradó, Sipí, Unión Panamericana, Condoto, and Certegui), Córdoba (Puerto Libertador and Tierralta), Guainia (Inirida and La Guadalupe), Nariño (Roberto Payán, Olaya Herrera, El Charco, Mosquera, Barbacoas, Santa Barbarba, Magüi, Francisco Pizarro, and San Andrés de Tumaco), Risaralda (Pueblo Rico and La Virginia), Valle del Cauca (Cartago), Vaupés (Taraira and Yavarate) and Vichada (Puerto Carreño and Cumaribo).</i> Vidutinė infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: <i>Antioquia, Amazonas, Bolivar, Cauca, Choco, Cordoba, Guajira, Narino</i> ir <i>Risaralda</i> teritorijose. Nedidelė rizika vyrauja keliaujant kai kuriose šių miestų teritorijose: <i>Amazona, Caqueta, Guaviare, Guainia, Meta, Putumayo, Vaupes,</i> ir <i>Vichada.</i> PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Komorų Sąjunga	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kongo Demokratinė Respublika	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
Kongo Respublika	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose pietinėse šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Korėjos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose šiaurinėse šalies teritorijose, dažniausiai <i>Gangwon-do</i> ir <i>Gyeonggi-do</i> provincijų teritorijose bei <i>Incheon</i> mieste. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kosta Rika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų, išskyrus <i>Argentina, Panama</i>.</p>
	<p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja šalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p>
	<p>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų): hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kroatija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuba	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Kuko salos	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Kuveitas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Laoso Liaudies Demokratinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus <i>Vientiane</i> . PSO rekomenduojama profilaktika: C.
Latvija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Lenkija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Lesotas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
Libano Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai vykstantys/atvykstantys į/iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Liberija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Libija	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: keliautojai vykstantys į šią šalį turi pasiskiepyti nuo meningokokinės infekcijos. Taip pat visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielito teritorijų (pvz.: Afganistano, Pakistano) privalo turėti įrodymą (kartu su viza) apie atliktą poliomielito vakcinaciją (keliautojas per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepijęs vakcina nuo poliomielito).</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Lichtenšteinas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Lietuva	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Liuksemburgas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Madagaskaras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, ypač pakrančių teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Madeira	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Majotas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Malaizija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Šalyje yra riboti maži maliarijos židiniai atokiose vietovėse (<i>Sabah, Sarawak</i> ir <i>Peninsular</i>). Rizikos nėra miestuose ir pakrantės teritorijose. Pranešama apie registruotus infekcijos atvejus dėl <i>P. knowlesi</i> sukėlėjo. Taip pat registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Malavis	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Maldyvai	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai vykstantys/atvykstantys į/iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Malis	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i>.</p> <p>Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie kelias tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Malta	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Jei yra būtina, jaunesni nei 9 mėn. kūdikiai, atvykstantys iš infekuotų geltonojo drugio teritorijų, gali būti izoluojami ar stebimi.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Marianos šiaurinių salų sandrauga	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Marokas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų, Tarptautiniame skiepavimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Maršalo salos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Martinika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Mauricijus	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mauritanija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į pietus nuo <i>Sacharos dykumos</i>.</p> <p>Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Sacharos dykumą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje išskyrus šiaurines teritorijas: <i>Dakhlet - Nouadhibou</i> ir <i>Tiris - Zemour</i>. Liepos - spalio mėn. (liūčių laikotarpiu) maliarijos rizika vyrauja <i>Adrar</i> ir <i>Inchiri</i> teritorijose. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Meksika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, retai lankomose turistų. Nedidelė infekcijos rizika vyrauja <i>Chiapas State (Costa)</i> teritorijoje. Tokiose šalies teritorijose kaip: <i>Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo</i> maliarijos rizika labai maža. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mergelių salos (Jungtinės Amerikos Valstijos)	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mianmaras	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

(anksčiau Birma)	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo, miškingose, kalnuotose ir pakrančių teritorijose <i>Rahkine State</i> . Infekcijos rizikos miestuose ir miesto rajonuose nėra. Registruotas atsparumas meflokinu <i>Kayin State</i> ir rytinėje <i>Shan State</i> teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. Šalyje registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Mikronezijos Federacinės Valstijos	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Moldovos Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Monakas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Mongolija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Monseratas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Mozambikas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Namibija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio - birželio mėn. <i>Ohangwena, Otjozondjupa, Oshana, Oshikoto, Omusati, Omaheke</i> rajonuose ir visus metus prie <i>Kunene</i> upės (<i>Kunene regione</i>), <i>Zambesi</i> upės (<i>Zambesi regione</i>) <i>Okavango</i> upės (<i>Kavango regione</i>). PSO rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Naujoji Kaledonija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Pastaba. Jei šalyje kiltų epidemijos pavojus, gali būti reikalaujama specialaus vakcinacijos sertifikato.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Naujoji Zelandija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Nauru	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Nepalas	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, ypač 20-yje <i>Terai</i> pasienio rajonuose ties siena su Indija bei tarp kalvų. Infekcijos protrūkiai dėl <i>P. falciparum</i> būdingi ypač liepos – spalio mėn. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys į šią šalį turi būti pasiskiepiję nuo poliomielito.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Nigerija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato ir skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Nigeris	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato ir skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų atvykstančių ir

	<p><u>išvykstančių iš Nigerio.</u></p> <p>Nerekomenduojama skiepytis tiems keliautojams, kurie keliaus tik po Sacharos dykumą.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Nikaragva</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (79,2 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (20,8 proc.) vyrauja visus metus didesnėse šalies teritorijose: <i>Autónoma del Atlántico Norte</i> regionuose, <i>Boaca</i>, <i>Chinandega</i>, <i>Jinotega</i>, <i>Léon</i> ir <i>Matagalpa</i>. Didžiausia infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja <i>Autónoma del Atlántico Norte</i> regionuose, <i>Rosita</i>, <i>Siuna</i>, <i>Bonanza</i>, <i>Puerto Cabezas</i>, <i>Waspan</i>. <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui – neregistruotas. PSO rekomenduojama profilaktika: P. vivax rizikos teritorijose: B, o P. falciparum – C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Niujė (Naujoji Zelandija)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Nyderlandai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Norfolko sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus <i>Galapagos</i> salas <i>Ekvadore</i> ir <i>Misioneso</i> provinciją <i>Argentinoje</i>.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Norvegija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Omanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. 2010 m. buvo registruoti vietiniai <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> protrūkiai <i>Ash Sharqiyah North Governorate</i> teritorijoje. Vietiniai infekcijos atvejai registruoti 2011 ir 2012 m. <u>PSO profilaktika nerekomenduojama.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Pakistanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 2000 m. jūros lygio, liepos – gruodžio mėn. kaimo vietovėse. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš <i>Pakistano</i>, <i>Afganistano</i>, <i>Nigerijos</i> privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto OPV arba IPV vakcina bei keliautojams atvykstantiems iš <i>Kongo Demokratinės Respublikos</i> bei <i>Sirijos Arabų Respublikos</i> – IPV vakcina. Jei keliautojas skiepavimo pažymėjime neturi įrodymo apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielioto, tuomet bus paskiepytas viena OPV ar IPV</p>

	<p>vakcinės dozės.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Palau	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Panama	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į rytus nuo <i>Panamos Kanalo zonos (Comarcas of Emberá ir Kuna Yala, Darién ir Colón provincija)</i>.</p> <p>Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama vykstantiems į vakarus nuo <i>Panamos Kanalo zonos, pačioje Panamos kanalo teritorijoje, Panamos mieste, Balbao ir San Blas salose</i>.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (>99 proc.) vyrauja visus metus provincijose prie Atlanto krantų ir ties siena su <i>Kosta Rika ir Kolumbija: Bocas del Toro, Chiriqui, Colon, Darien, Ngobe Bugle, Panama ir Veraguas. Panamos mieste, Kanalo zonoje ir kitose provincijose rizika maža arba visai nėra. PSO rekomenduojama profilaktika: rizikos teritorijose – B, rytinėse šalies endeminėse teritorijose besiribojančiose su Kolumbija: C.</i></p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Papua - Naujoji Gvinėja	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 1800 m. jūros lygio. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Paragvajus	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis asmenims vykstantiems į <i>Asuncion</i> miestą.</p> <p>Maliarija. Vietinių infekcijos atvejų neregistruojama nuo 2012 m. Ankstesni susirgimai buvo registruoti <i>Alto Parana</i>, <i>Canindeyu</i>, ir <i>Caaguazu</i> šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Peru	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į šalies rizikos teritorijas (miškingas teritorijas, džiungles, esančias žemiau kaip 2300 m virš jūros lygio): <i>Amazonas</i>, <i>Loreto</i>, <i>Madre de Dios</i>, <i>San Martin</i>, <i>Ucayali</i>, <i>Puno</i>, <i>Cuzco</i>; <i>Junín</i>, <i>Pasco</i> ir <i>Huánuco</i>, <i>Apurimac</i>; šiaurės <i>Huancavelica</i>; šiaurės rytai <i>Ancash</i>; rytų <i>La Libertad</i>; šiaurės ir rytų <i>Cajamarca</i>; šiaurės ir šiaurės rytų <i>Ayacucho</i> ir rytų <i>Piura</i>. Vykstantiems tik į <i>Andes</i>, <i>Cuzco miestą</i>, <i>Limą</i>, <i>Machu Picchu</i>, <i>Inca Trail</i> teritorijas skiepytis nerekomenduojama.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (84 proc.), <i>P. falciparum</i> (16 proc.) vyrauja visus metus kaimo teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Rizikos teritorijos yra <i>Amazonas</i>, <i>Junín</i>, <i>San Martin</i>, <i>Loreto</i>. 98 proc. <i>P. falciparum</i> atvejų buvo registruoti <i>Loreto</i> apskrityje, šalia Amazonės. PSO rekomenduojama profilaktika P. vivax rizikos teritorijose: B; Loreto apskrities teritorijose - C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Pietų Afrikos Respublika	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose <i>Mpumalango</i> provincijose (įskaitant <i>Kruger</i> Nacionalinį parką), Šiaurės provincijose ir šalies šiaurės rytinės dalies <i>KwaZulu-Natal</i> srityje. Didžiausia infekcijos rizika</p>

	<p>vyrauja spalio-gegužės mėn. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Pietų Sudanas	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Pitkerno sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Portugalija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Prancūzija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Prancūzijos Gviana	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>

	<p>Maliarija. Didelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (45 proc.), <i>P. vivax</i> (55 proc.) vyrauja visus metus teritorijose, besiribojančiose su Brazilija (<i>Oiapoque river valley</i>) ir Surinamu (<i>Maroni river valley</i>). 13 apskričių teritorijose, infekcijos rizika maža. Taip pat kur vyksta migracija iš Brazilijos yra registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas daugumai antimaliarinių vaistų. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Prancūzijos Polinezija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Puerto Rikas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Pusiaujo Gvinėja</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Rejunjonas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų</p>

	<p>vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Rytų Timoro Demokratinė Respublika	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Ruanda	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Rumunija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Rusija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Maliarija. Labai ribota infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> tose rajonuose, kuriuose didelė migracija iš pietų šalių. PSO profilaktikos nerekomenduoja.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

<p style="text-align: center;">Saba</p> <p style="text-align: center;"><i>(sala Pavėjinių Antilų salų regione Karibų jūroje)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Sakartvelas</p> <p style="text-align: center;"><i>(Gruzija)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriuose kaimo vietovėse, esančiuose pietrytinės šalies dalyje besiribojančiuose su <i>Azerbaidžanu</i>. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų ir ne esantys pasiskiepiję nuo poliomielioto ar negalintys pateikti sertifikato, įrodančio apie atliktą vakcinaciją, pasienyje bus pasiskiepyti oraline poliomielioto vakcina.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Saliamono salos</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, išskyrus kai kurias rytines ir pietines saleles. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p style="text-align: center;">Salvadoras</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Maliarija. Labai maža infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kaimiškose vietovėse. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Samoa	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
San Marinas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
San Tomė ir Prinsipė	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.
Saudo Arabija	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugsėjo-sausio mėn. teritorijose prie pietinės sienos su <i>Yemen</i> . Maliarijos rizikos nėra <i>Mecca</i> ir <i>Medina</i> . PSO rekomenduojama profilaktika: C.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, vykstantys į <i>Umrah</i> ir <i>Hajj</i> teritorijas sezoniniam darbui, turi pateikti galiojantį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135) nuo meningokokinės infekcijos (ne anksčiau kaip 10 dienų iki išvykimo ir ne vėliau kaip 3 metai iki atvykimo į Saudo Arabiją). Keliautojams, atvykusiems iš <i>Benin</i> , <i>Burkina Faso</i> , <i>Cameroon</i> , <i>Chad</i> , <i>Central African Republic</i> , <i>Côte d'Ivoire</i> , <i>Eritrea</i> , <i>Ethiopia</i> , <i>Gambia</i> , <i>Guinea</i> , <i>Guinea-Bissau</i> , <i>Mali</i> , <i>Niger</i> , <i>Nigeria</i> , <i>Senegal</i> , <i>Sudan</i> , <i>South Sudan</i> uoste bus taikoma chemoprofilaktika.

	<p>Taip pat visi keliautojai atvykstantys iš Afghanistan, Cameroon, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Guinea, Iraq, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Syrian Arab Republic, Ukraine, ir Yemen privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomieliito vakcinaciją (bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepiję). Visi keliautojai, atvykę į <i>Saudo Arabijos</i> ir nepriklausomai nuo amžiaus ir skiepavimo būklės šalies pasienyje bus paskiepyti 1 OPV doze.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Seišeliai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Kiti reikalavimai: keliautojams, atvykstantiems iš šalių, kuriose dar registruojami poliomieliito protrūkiai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomieliito.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sen Pjeras ir Mikelonas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Senegalas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Mažesnė infekcijos rizika vyrauja sausio-birželio mėn. tik Centrinuose vakarų regionuose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės</p>

	revakcinacija.
Sent Kristoferio ir Nevio Federacija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Kiti reikalavimai: keliautojai, atvykstantys iš šalių, kuriose dar registruojami poliomielite atvejai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomielite (OPV).
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Sent Lusija <i>(Sala ir valstybė Mažuosiuose Antiluose)</i>	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Serbija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Siera Leonė	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų amžiaus keliautojų.</u>
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Singapūras	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei vykusių

	<p>tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sint Eustatijus (sala Karibų jūroje, Nyderlandų Karalystės dalis)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sint Martenas (San Marteno salos pietinė dalis)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Sirijos Arabų Respublika</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> yra ribota, ir vyrauja gegužės-spalio mėn. ties šiaurine šalies siena, ypač šiaurės rytinėje dalyje ir <i>El Hasaka Governorate</i> kaimo vietovėse (maliarijos atvejų neregistruota nuo 2005 m.). <u>PSO profilaktikos nerekomenduoja.</u></p>
	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai, atvykstantys iš <i>Kamerūno, Pusiaujo Gvinėjos, Pakistano</i>, bei keliautojai vykstantys iš <i>Sirijos Arabų Respublikos</i> į kitas šalis privalo būti pasiskiepiję nuo poliomielito.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Slovakija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Slovėnija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Somalis	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Paprastai nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į šiuos regionus: <i>Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle ir Middle Shabelle.</i></p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja Centrinėje ir Pietinėje šalies dalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Sudanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat geltonojo drugio sertifikato gali reikalauti keliautojų išvykstančių iš Sudano.</p> <p>Pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos.</p> <p>Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik <i>Sacharos dykumoje</i> ir į <i>Khartoum miestą</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Labai maža rizika vyrauja šalies šiaurėje, Raudonosios jūros pakrantėje, didesnė rizika – centrinėje bei pietinėje šalies dalyje. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Suomija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės</p>

	revakcinacija.
Surinamas	Yra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl pasiskiepyti ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (40 proc.), <i>P. vivax</i> (58 proc.), abiejų kombinacija 2 proc. vyrauja visus metus centrinėje šalies dalyje, kalnuotose savanos vietovėse. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja ties rytine šalies siena ir aukso kasybos rajonuose. Labai nedidelė rizika – <i>Paramaribo</i> mieste bei kitose pakrantės vietovėse. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas meflokinui. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Svazilandas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose žemumose, ypač <i>Big Bende, Mhlume, Simunye ir Tshaneni</i> . Didžiausia infekcijos rizika vyrauja lapkričio – gegužės mėn. <u>PSO rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šiaurės Makedonija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šri Lanka	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.

	<p>Kiti reikalavimai: visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite ir keliaujantys į endemines poliomielite teritorijas, privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją. Jei keliautojai neturės tokio įrodymo, pasienyje bus pasiskiepyti oraline poliomielite vakcina.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Šv. Bartolomėjaus sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Šv. Bartolomėjaus sala</p>	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Šv. Bartolomėjaus sala</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Šv. Elenos sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Šv. Elenos sala</p>	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Šv. Elenos sala</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Šv. Martyno sala</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Šv. Martyno sala</p>	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Šv. Martyno sala</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Šv. Vincentas ir Grenadinai</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
<p>Šv. Vincentas ir Grenadinai</p>	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
<p>Šv. Vincentas ir Grenadinai</p>	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Švedija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Šveicarija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Tadžikistanas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Maliarija. Paskutinis vietinis atvejis dėl <i>P. falciparum</i> registruotas 2009 m., o dėl <i>P. vivax</i> – 2015 m. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. ties pietine šalies siena (<i>Khatlon regionas</i>), kai kuriose centrinėse (<i>Dushanbe</i>), vakarinėse (<i>Gorno-Badakhshan</i>) ir šiaurinėse (<i>Leninabad regionas</i>) šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tailandas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika vyrauja visus metus kaimo teritorijose, ypač – miškingose, kalnuotose vietovėse, taip pat šalies pasienyje. Infekcijos rizikos nėra didžiuosiuose miestuose (<i>Bangkok, Chiang Mai city, Pattaya</i> ir kituose miestuose), <i>Samui ir Phuket salose</i>. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas meflokinui, kai kuriose teritorijose ties šalies siena su <i>Cambodia</i> ir <i>Myanmar</i>, o <i>P. vivax</i> atsparumas – chlorochinui; Taip pat registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. PSO rekomenduojama profilaktika: rizikingose teritorijose A, o prie <i>Cambodia</i> ir <i>Myanmar</i> sienų: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tanzanija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.

	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 1800 m jūros lygio. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Terksas ir Kaikosas <i>(Jungtinės Karalystės užjūrio teritorija)</i></p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Togo Respublika</p>	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl <u>geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</u></p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Tokelau</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Tongos Karalystė</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Trinidadas ir Tobagas</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, į kurių maršrutą yra įtrauktas <i>Trinidadas</i>. Keliaujantiems</p>

	<p>kruiziniais laivais ar oro transportu tik į <i>Tobagą</i> - skiepytis nebūtina.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tristanas da Kunja	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tunisas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Turkija	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizikos šalies teritorijose – nėra, o paskutinis vietinis infekcijos atvejis registruotas 2010 m. <u>PSO profilaktikos nerekomenduoja.</u></p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Turkmėnistanas (<i>Turkmėnija</i>)	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Tuvalu	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Uganda	<p>Yra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija,</u> todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus</p>

	<p>keliautojų.</p> <p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Ukraina	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Urugvajus	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Uzbekistanas	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Pavieniai infekcijos atvejai dėl <i>P. vivax</i> buvo registruoti kai kuriuose pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, besiribojančiuose su <i>Afganistanu, Kirgizija ir Tadžikistanu.</i> PSO rekomenduojama profilaktika: A.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vanuatu	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Maliarija. Maža ar vidutinė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas chlorochinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Veiko sala	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p> <p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Venesuela	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš <i>Brazilijos</i> bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams.</p> <p>Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į <i>Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas ir Yaracuy, Distrito Federal</i> valstijas. Taip pat vykstant į teritorijas esančias aukščiau nei 2300 m. aukštyje: <i>Trujillo, Merida, ir Tachira; Falcon ir Lara; Margaritos Sala; Caracas; Valencia</i>.</p>
	<p>Maliarija. Didžiausia infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (74,6 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (25,4 proc.) vyrauja visus metus kai kurių rajonų (<i>Amazonas, Anzoategui, Bolívar, Delta Amacura</i>) kaimo vietovėse. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Apure, Monagas, Sucre ir Zulia</i> vietovėse. Dažniausia <i>P. falciparum</i> rizika - <i>Amazono (Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare) ir Bolivar (Angostura, Cedeno, Ell Callao, Heres, Gran Sabana, Piar, Rocio, Sifontes), ir Sucre (Benitez, Bermudez, Cajigal y Arismendi)</i> džunglių teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui, sulfadoksinui – pirimetaminui. PSO rekomenduojama profilaktika: P.vivax rizikos teritorijose - B, P. falciparum rizikos teritorijose C.</p>
<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: geltonoji karštligė, hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>	
Vengrija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vietnamas	Nėra privalomų skiepų keliautojams.
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus išskyrus miesto centrus: <i>Red River delta, Mekong delta</i> bei pakrantės lygumą <i>Centriniam Vietname</i>. Didžiausia infekcijos rizika yra kalnuotose vietovėse žemiau nei 1500 m. jūros lygio 18°N į pietus esančiose teritorijose, ypač – <i>Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai ir Kon Tum, Binh Phuoc provincijose</i> bei vakarinėse <i>Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam and Quang Tri pakrantės</i> vietovėse. Taip pat yra registruotas atsparumas meflokinui. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Vokietija	Nėra privalomų skiepų keliautojams.

	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Volisas ir Futūna (Prancūzijai priklausanti užjūrio teritorija)</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Zambija</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p>Taip pat skiepytis nuo geltonojo drugio paprastai nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į <i>Šiaurės Vakarų ir Vakarų provincijas</i>.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p>Zimbabvė</p>	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>
	<p>Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio – birželio mėn. teritorijose, esančiose žemiau nei 1200 m. jūros lygio ir visus metus <i>Zambezi žemumoje</i>. Maža infekcijos rizika vyrauja <i>Harare</i> ir <i>Bulawayo</i> rajonuose. PSO rekomenduojama profilaktika: C.</p>
	<p>Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B., vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
	<p>Nėra privalomų skiepų keliautojams.</p>

Žaliojo Kyšulio Respublika <i>(Cabo Verde)</i>	Geltonasis drugys. Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	Maliarija. Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugpjūčio-lapkričio mėn., įskaitant <i>Santiago salą</i> ir <i>Boa Vista salą</i> . PSO rekomenduojama profilaktika: A.
	Rekomenduojami skiepai dėl kitų galimų infekcijų: hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Informacija apie skiepėjimus keliautojams teikiama Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre Nugalėtojų g. 14D, Vilnius.

Tel. 8 5 2300124 arba +370 638 53979;

El. paštas: keliautojams@ulac.lt;

Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje: www.ulac.lt; <http://www.ulac.lt/lt/keliautojams> .

Informacijos šaltiniai:

1. Countries with risk of yellow fever transmission and countries requiring yellow fever vaccination. *World Health Organization*. Geneva, June 14, 2018. [<http://www.who.int/ith/ith-yellow-fever-annex1.pdf?ua=1>].
2. International travel and health. *World Health Organization*. [<http://www.who.int/ith/en/>].
3. Vaccination requirements and recommendations for international travellers, including yellow fever and malaria (List of countries, territories and areas). *World Health Organization*. Geneva, June 14, 2018. [<http://www.who.int/ith/ith-country-list.pdf?ua=1>].