

Vartok
antibiotikus
atsakingai !

Europos
supratimo apie
antibiotikus diena

Europos sveikatos iniciatyva



ULAC

Atsparumas
antibiotikams
Europoje **didėja**,
keldamas grėsmę
žmonių sveikatai

Susirūpinimą kelia
daugeliui antibiotikų
atsparios bakterijos,
kurios sukeldamos
infekcijas, apsunkina
gydymą, padidina
gydymo kaštus ir gali
sukelti mirtį

Praėjus tik 70 metų
po antibiotikų
atradimo mes
susiduriame su
tikimybe prarasti
veiksmingą gydymą

Apie pusę ligoninėse išrašomų
antibiotikų yra **nebūtinai** arba
netinkamai vartojami



Antibiotikų valdymo programos gali
padėti sumažinti atsparumą
antibiotikams sveikatos priežiūros
įstaigose



Antibiotikų
valdymo
programos gali būti
įgyvendinamos
atliekant šiuos
veiksnius

Gaukite vadovo
pritarimą, bei
užtikrinkite personalo
palaikymą ir išteklių
paskirstymą



Paskirti atsakingus
asmenis: už bendrą
programą ir už
antibiotikų vartojimą



Suformuokite komandą:
šeimos gydytojai, infekcijų
kontrolės specialistai,
klinikiniai farmacininkai




Atrasti ir naudoti tinkamus įrankius, pvz.
antibiotikų naudojimo gaires, strategiją
elektronines stebėjimo sistemas ir kt.

Stebėti ir pranešti: atliekant auditą
stebėti antibiotikų išrašymo ir
atsparumo tendencijas, suteikti
informaciją komandai



Užtikrinti mokymus, švietimą ir
kvalifikacijos kėlimą:
gydytojams, laboratorijos
darbuotojams, slaugytojoms,
pacientams ir jų šeimos nariams





Veiksmingos
antibiotikų
valdymo
programos
Europoje



5

LENKIJA

Plėtojant antibiotikų išrašymo gaires, išankstinis leidimas dėl riboto antibiotikų vartojimo leido sumažinti bendrą antibiotikų suvartojimą bendrame pediatrijos skyriuje

4

ŠVEDIJA

Du kartus per savaitę atliekamas auditas ir atgalinis ryšys vidaus medicinos skyriuje leido 27 proc. sumažinti antibiotikų vartojimą, ypač plataus spektro antibiotikų, sutrumpėjo gydymo trukmė

3

ISPANIJA

Po 1 metų, švietimas su atgaliniu ryšiu leido 26 proc. padidinti tinkamo gydymo dažnį ir 42 proc. sumažinti antibiotikų suvartojimą konkrečioje ligoninėje

2


NYDERLANDAI

Buvo vykdomas atvejų auditas, skirtas pakartotinai įvertinti antibiotikų vartojimą po 48 val., kuris padėjo sumažinti antibiotikų vartojimą ir buvimo trukmę urologijos skyriuje konkrečioje ligoninėje. Programa taip pat turėjo teigiamą tiesioginę investicijų grąžą.

1

ITALIJA

4 metų infekcijų kontrolės programa sumažino infekcijų, sukeltų karbapenemui atsparių bakterijų dažnį konkrečioje ligoninėje. Programoje buvo numatytos karbapenemo naudojimo valdymo priemonės



Šio informacinio grafiko informacija yra pagrįsta moksliniais įrodymais. Detalesnę informaciją rasite : <http://antibiotic.ecdc.europa.eu>

Atminkite: kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį, siekiant užtikrinti antibiotikų veiksmingumą