

## ĮVAIRIŲ ŠALIŲ, TERITORIJŲ IR VIETŲVIŲ SĄRAŠAS

(Keliautojams būtinų/rekomenduojamų skiepų, taip pat geltonojo drugio ir maliarijos prevencinių priemonių rekomendacijos pagal Pasaulio sveikatos organizacija, 2016)

2 lentelė. Imunoprofilaktikos, antimaliarinių vaistų reikalavimai bei rekomendacijos pagal įvairias pasaulio šalis (teritorijas, vietas).

Afganistanas	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų geltonojo drugio teritorijų.
	<b>Maliarija.</b> <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> rizika užsikrėsti gegužės - lapkričio mėn. teritorijose, esančiose žemiau 2000 m virš jūros lygio. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Airija	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Albanija	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Alžyras	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> <i>P. vivax</i> rizika labai nedidelė. Pavieniai atvejai registruoti pietiniuose ir pietryčių kaimeliuose (Adrar, El Qued, Ghardaia, Illizi, Quargla, Tamanrasset). <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Amerikos Samoa	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

<b>Andora</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Angilija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Angola</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.
	<b>Maliarija.</b> Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika užsikrėsti visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Antigva ir Barbuda</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Argentina</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų vykstančių į Misiones ir Corrientes (Beron de Astrada, Capital, General Alvear, General Paz, Itati, Paso de los Libres, San Cosme, San Migelio, San Martin ir San Tome sritys). Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti ir vykstant į Formosa, Chaco (Bermejo), Jujuy (Ledesma, Santa Barbara, San Pedro ir Valle Grande sritys) ir Saltos provincijas (Antos, Jose de San Martin, Oran ir Rivadavia sritys). Vykstant į šią šalį - geltonojo drugio sertifikato nereikalaujama.
	<b>Maliarija.</b> Rizika nedidelė, tik kaimo teritorijose ties siena su Bolivija ir Paragvajumi. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Armėnija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.

	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Australija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją, išskyrus Galapagų salas Ekvadore ir Misioneso provinciją Argentinoje.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Austrija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Azerbaidžanas</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> <i>P. vivax</i> nedidelė rizika vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriose žemose vietovėse, ypač tarp Kuros ir Arakso upių. Rizikos nėra Baku mieste (sostinėje). <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Bahamos</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus atvykstant iš Gajanos, Surinamo, Trinidado ir Tobago) bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Bahreinas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Baltarusija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Bangladešas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Maliarija.</b> Didelė rizika užsikrėsti Chittagong Hill Tract teritorijose (Bandarban, Rangamati ir Khagrachari), Chittagong ir Cox Bazaar teritorijose. Infekcijos rizika maža yra Dakos mieste, Hobigonj, Kurigram, Moulvibazar, Mymensingh, Netrakona, Sherpur, Sunamgonj ir Sylhet teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Barbadosas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus atvykstant iš Gajanos, Surinamo, Trinidado ir Tobago) bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Belgija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Belizas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Tam tikrose teritorijose vyrauja <i>P. vivax</i> maliarijos rizika. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų (įskaitant Belizą ar gyvenančius Belize) privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,

	hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Beninas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų bei keliautojų vykusių tranzitu per geltonojo drugio infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Bermudų salos</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Bisau Gvinėja</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.
	<b>Maliarija.</b> Didžiausia <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja visus metus visoje šalyje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Bolivija</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per geltonojo drugio infekuotą teritoriją. Taip pat visiems, vyresniems nei 9 mėnesių amžiaus asmenims, vykstantiems į Beni, Pando ir Santa Cruz, ir kai kurias Chuquisaca, Cochabamba, La Paz ir Tarija teritorijas rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, vykstantiems į teritorijas 2300 m. virš jūros lygio ir į aukščiau nepaminėtas teritorijas.
	<b>Maliarija.</b> Didžiausia rizika <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalyje. <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vyrauja Santa Cruz ir šiaurinėje šalies teritorijoje - Beni ir Pando, ypač Guayaramerin, Riberalta vietovėse. <u>Rekomenduojama profilaktika: B, o vykstant į Benį, Pando, Santa Cruz teritorijas: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

<b>Bosnija ir Hercegovina</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Kiti reikalavimai:</b> Bosnijos ir Hercegovinos gyventojams vykstantiems į kitas šalis rekomenduojama pasiskiepyti nuo choleros, meningokokinės infekcijos.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Botsvana</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Didžiausia <i>P. falciparum</i> rizika vyrauja lapkričio-gegužės/birželio mėn. šiaurinėse šalies teritorijose: Bobirwa, Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Brazilija</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl asmenims, vyresniems nei 9 mėn., vykstantiesiems į endemines teritorijas: Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins valstijos ir į kai kurias Piaui, Bahia, Parana, Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Rekomenduojama skiepytis vykstantiems prie Iguaku krioklių. <u>Rizikos nėra šiose valstijose: Rio de Žaneire, Sao Polo, Salvadore, Recife ir Fortaleza.</u>
	<b>Maliarija.</b> Didelė rizika ( <i>P. vivax</i> – 84 proc.; <i>P. falciparum</i> – 15 proc.) vyrauja visus metus miškingose teritorijose, esančiose žemiau 900 m virš jūros lygio “Legal Amazonia” regione (9 valstijose: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão (vakarinėje dalyje), Mato Grosso (šiaurinėje dalyje), Pará (išskyrus Belemo miestą), Rondônia, Roraima ir Tocantins). Didžiausia rizika – džiunglių teritorijose, tačiau užsikrėsti galima netgi kai kurių miestų Cruzeiro do Sul, Manaus, Pôrto Velho, Boa Vista, Macapá, Maraba, Rio Branco ir Santarém teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Britų mergelių salos</b> <b>(Jungtinės Karalystės užjūrio teritorija)</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Brunėjaus Darusalamas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų

	<p>vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika vyrauja dėl <i>P. knowlesi</i>. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p> <p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielite vakcinaciją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Bulgarija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Burkina Faso</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Burundis</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Butanas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: Chukha, Dagana, Pemagatshel, Samdrup, Jonkhar, Samtse, Sarpang ir Zhemgang teritorijose ištisus metus. Neregistruotas infekcijos perdavimas Bumthang, Gasa, Paro ir Thimphu</p>

	<p>teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Centrinės Afrikos Respublika	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čadas	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų amžiaus keliautojų atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltono drugio visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik Sacharos dykumoje.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čekija	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Čilė	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Danija	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<b>Dominika</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Dominikos Respublika</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač kai kuriose vakarinės dalies provincijų kaimo vietovėse (Elias Pina, Dajabon ir San Juan). <u>Rekomenduojama profilaktika: B.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Dramblio Kaulo Krantas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Džibutis</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Egiptas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Labai nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. įskaitant ir El Fajumo teritoriją. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u>

	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų (pvz.: Afganistano, Pakistano) privalo turėti įrodymą (kartu su viza) apie atliktą poliomielioto vakcinaciją (keliautojas per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepijęs OPV ar IPV vakcina).</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Ekvadoras</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, o sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, kurie keliaus aukščiau kaip 2300 m. virš jūros lygio, taip pat keliaujantiems į Guayaquil ir Quito miestus bei Galápagos salas.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (86 proc.), <i>P. falciparum</i> (14 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančiose žemiau kaip 1500 m. jūros lygio. Didelė maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja Esmeraldos provincijoje. Rizikos nėra Guayaquil, Quito ir Andean regionuose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Eritrėja</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Paprastai nerekomenduojama skiepyti visų keliautojų vykstančių į šias teritorijas kaip: Anseba, Debub, Gaš Barka, Mae Kel ir Semenawi Keih Bahri, Dahlak Archipelagos.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> ir <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančiose žemiau kaip 2200 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra Asmaros teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Estija</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<b>Etiopija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams. Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į Afar ir Somalio provincijas.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (40 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (60 proc.) vyrauja visus metus visoje šalies teritorijose, esančiose žemiau kaip 2000 m. jūros lygio. Maliarijos rizikos nėra Addis Ababa. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Farerų salos</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Fidžis</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Filipinai</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 600 m. jūros lygio, tik išskyrus Aklan, Albay, Bilaran, Benguet, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Northern Leyte, Southern Leyte, Masbate, Marinduque, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Siquijor, Sorsogon, Surigao Del Norte provincijas, Manilą. Manoma, jog nėra rizikos dideliuose miestuose ir lygumose. Taip pat registruotas <i>P.knowlesi</i> Palawan teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Folklando (Malvinų) salos</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>

	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gabonas	<p><b>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>,</b> todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</p>
	<p><b>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i></b> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gajanos Respublika	<p><b>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>,</b> todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p>
	<p><b>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (36 proc.), <i>P. falciparum</i> (53 proc.), abiejų sukėlėjų (11 proc.)</b> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Pavienių atvejų buvo registruota tankiai gyvenamose pakrantės teritorijose. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gambija	<p><b>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>,</b> todėl geltonojo drugio sertifikato ir geltonojo drugio skiepo reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p><b>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i></b> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Gana	<p><b>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>,</b> todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>
	<p><b>Maliarija. Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i></b> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Gibraltaras</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Graikija</b>	<b>Maliarija.</b> Egzistuoja labai maža <i>P. vivax</i> rizika nuo gegužės iki spalio mėnesio. Turistų lankomose vietose rizikos nėra. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Grenada</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Grenlandija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Gruzija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriuose kaimo vietovėse, esančiuose pietrytinės šalies dalyje besiribojančiuose su Azerbaidžanu. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų ir neesantys pasiskiepę nuo poliomielioto ar negalintys pateikti sertifikato, įrodančio apie atliktą vakcinaciją, pasienyje bus sudaryta galimybė pasiskiepyti oraline poliomielioto vakcina.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

<b>Guamas</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Gvadelupa</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Gvatemala</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus teritorijose, esančiose žemiau nei 1500 m. jūros lygio. Vidutinė rizika vyrauja Escuintla ir Izabal teritorijose, maža - Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Peten, Quiche (Ixcan), Suchitepequez ir Zacapa. <u>Rekomenduojama profilaktika: B.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Gvinėja</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 m. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Haitis</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: B arba C,</u> jeigu kelionės metu CHL yra neprieinamas.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,

	hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Hondūras</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus atvykstančius iš Centrinės Afrikos Respublikos, Pietų Sudano, Panamos, Pietų Amerikos) bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (79 proc.), <i>P. falciparum</i> (20 proc.), abiejų sukėlėjų (0,8 proc.) vyrauja visus metus. Ypač didelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> ir <i>P. falciparum</i> kyla šiose teritorijose: Gracias a Dios, Colon, Olancho ir Yoro teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: B.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Honkongas</b> <b>(Specialusis administracinis Kinijos regionas)</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Indija</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš infekuotų teritorijų. Asmenys (išskyrus kūdikius iki 6 mėn.), atvykstantys į Indiją oro ar jūrų transportu nepraėjus 6 dienoms (vykstantiems jūrų transportu iki 30 dienų) po lankymosi infekuotoje šalyje ar vykę tranzitu per jas ir neesantys pasiskiepę bei neturintys skiepimo nuo geltonojo drugio sertifikatų, gali būti izoliuojami 6 dienoms pagal Indijoje galiojančias taisykles. Indijoje infekuotomis teritorijomis yra laikomos šios šalys: <b>Afrikoje:</b> Angola, Beninas, Burkina Faso, Burundis, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Kongo Demokratinė Respublika, Pusiaujo Gvinėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja-Bisau, Kenija, Liberija, Malis, Nigeris, Nigerija, Ruanda, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Togas, Uganda, Mauritanija. <b>Amerikoje:</b> Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Ekvadoras, Prancūzijos Gviana, Gviana, Panama, Peru, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela.
	Šį sąrašą Indijos vyriausybė gali papildyti, jei pranešama apie geltonojo drugio atvejį, kuris į sąrašą nėra įtrauktas.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Santykinai didelė rizikos tikimybė vyrauja šiaurės rytinėse teritorijose: Andaman ir Nicobar salos, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka (išskyrus Bangalore miestą), Madhya Pradesh, Maharashtra (išskyrus Mumbai, Nagpur, Nasik ir Pune miestus), Orissa ir Vakarų Bengalas (išskyrus Kolkata miestą). <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
<b>Kiti reikalavimai:</b> pasiskiepėjimas oraline poliomieliito vakcina reikalaujamas iš keliautojų (4 savaitės iki išvykimo), atvykstančių iš endeminių poliomieliito teritorijų:	

	<p>Afganistano, Nigerijos, Pakistano bei iš šalių, kuriuose registruotas laukinio poliomieliito viruso cirkuliavimas: Etiopijos, Kenijos, Somalio, Sirijos.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Indonezija</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika vyrauja visus metus visoje rytinėje šalies teritorijoje (Papua, Vakarų Papua, Maluku, Šiaurės Maluku ir Rytų Nusa Tenggara). Maliarijos rizika taip pat yra ir kitose šalies teritorijose, išskyrus: Džakartą, didelius miestus ir turistų lankomas vietas. Pranešama apie registruotus <i>P. knowlesi</i> infekcijos atvejus Kalimantan. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Irakas</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja gegužės-lapkričio mėn. šiauriniuose šalies rajonuose, esančiuose žemiau nei 1500 m. jūros lygio (Duhok, Erbil ir Sulaimaniya provincijose). <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u></p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, ar vykstančių iš Irako į endemines teritorijas privalo pasiskiepyti oraline poliomieliito vakcina (OPV).</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Iranas</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> bei maža rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja kovo-lapkričio mėn. Hormozgan, Kerman (tropinėje dalyje) ir Sistan–Baluchestan (pietinėje dalyje) provincijų kaimo vietovėse. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų, Tarptautiniame skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime privalo turėti įrodymą</p>

	apie ne anksčiau nei 4 sav.-12 mėn. laikotarpyje atliktą poliomieliito vakcinaciją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Islandija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Ispanija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Italija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Izraelis</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Jamaika</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Kiti reikalavimai:</b> Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į Jamaiką turistiniais tikslais ne ilgiau nei 30 dienų laikotarpiui, privalo pateikti dokumentą, įrodanti apie atliktus skiepus nuo tymų, raudonukės ir poliomieliito.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Japonija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

<p><b>Jemenas</b></p>	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, ypač rugsėjo-vasario mėn., visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio, išskyrus Sana miestą. Ribota rizika stebima Socotra saloje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C, o Socotra saloje – A.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Jordanija</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Jungtinė Karalystė</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Jungtinės Amerikos Valstijos</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> visose valstijose vaikams, pradantiems lankyti mokyklą, būtini skiepai nuo difterijos, tymų, poliomielite, raudonukės, daugelyje valstijų – ir nuo stabligės, kokliušo ir epideminio parotito. Skiepai nuo <i>B tipo Haemophilus influenzae</i> infekcijos daugelyje valstijų būtini prieš pradant lankyti ikimokyklines vaikų įstaigas. Suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Jungtiniai Arabų Emyratai</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Juodkalnija (Montenegro)</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<b>Kaimanų salos</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Kalėdų sala</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Kambodža</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus, ypač miškingose vietovėse. Taip pat <i>P. falciparum</i> maliarijos rizika vakarinėje Kambodžos dalyje, <i>P. vivax</i> rytinėje šalies dalyje. Infekcijos rizikos nėra šiose teritorijose: Phnom Penh ir Tonle Sap (Siem Reap). <u>Rekomenduojama profilaktika: D.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Kamerūnas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Kanada</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Kataras</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų

	<p>privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomieliteo vakcinaciją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kazachstanas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kenija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams. Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į Šiaurės rytų provinciją; Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi ir Tanariver Coastal provinciją; Nairobi ir Mombasa miestus.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Nedidelė maliarijos rizika vyrauja Nairobije ir teritorijose, esančiose aukščiau nei 2500 m. jūros lygio (Centrinėse, Rytinėse, Vakarinėse ir Nyanza, Rift Valley provincijose). <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kinija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Kinijoje daugiausiai registruojami tik įvežtiniai maliarijos atvejai iš maliarijos endeminių teritorijų. Nedidelė rizika vyrauja kai kuriose šalies teritorijose: Yunnan provincijoje, kuri ribojasi su Mianmaru bei Tibete. Taip pat nedidelė maliarijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja Yunnan provincijoje, kuriame egzistuoja atsparumas antimaliariniais vaistams. <u>Rekomenduojama profilaktika: A</u> (išskyrus Yunnan provinciją, kurioje rekomenduojama profilaktika: D).</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kipras</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Kirgizija</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. kai kuriose pietinėse ir vakarinėse šalies teritorijose ties pasieniu su Tadžikistanu ir Uzbekistanu (Batken, Jalal-Abad ir Osh regionai) ir Bishkek pakraščiuose. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Kiribatis</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Kolumbija</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl keliautojams rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į vietoves esančias aukščiau 2300 m. virš jūros lygio, taip pat keliaujantiems į Bogota ir į San Andrés y Providencia.
	<b>Maliarija.</b> Didelė infekcijos rizika vyrauja šiose teritorijose: Antioquia, Bolivar, Cauca, Choco, Cordoba, Guajira, Narino ir Risaralda teritorijose. Nedidelė rizika vyrauja keliaujant į Amazonas, Caqueta, Guaviare, Guainia, Meta, Putumayo, Vaupes, ir Vichada. Taip pat šalyje yra registruojami sukėlėjo <i>P. falciparum</i> atsparumas chlorochinui. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Komorai</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Kongas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo

	<p>drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kongo Demokratinė Respublika</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija.</u> todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p><b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose pietinėse šalies teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Korėjos Respublika (Pietų Korėja)</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kai kuriose šiaurinėse šalies teritorijose, dažniausiai Gangwon-do ir Gyeonggi-do provincijų teritorijose bei Incheon mieste. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kosta Rika</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus Burundi, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Kenya, Mali, Mauritania, Niger, Central African Republic, Rwanda, Senegal, South Sudan, Togo, Uganda; Argentina, Guyana, Panama, Paraguay, Suriname, Trinidad, Tobago) bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>

	<p><b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja Matina kantonuose, Limon provincijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kroatija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kuba</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kuko salos</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Kuveitas</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Laoso Liaudies Demokratinė Respublika</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Vientiane. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Latvija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Lenkija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>

	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Lesotas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Libanas</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Liberija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Libija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai vykstantys į šią šalį turi pasiskiepyti nuo meningokokinės infekcijos. Taip pat keliautojai atvykstantys iš Afganistano, Pakistano privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielito vakcinaciją (keliautojas per paskutinius 12 mėn. ar bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepijęs nuo poliomielito).</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Lichtenšteinas</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<b>Lietuva</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai, atvykstantys iš šalių, kuriose dar registruojami poliomielite atvejai, turi būti pasiskiepę nuo poliomielite (OPV).
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Liuksemburgas</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Madagaskaras</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, ypač pakrančių teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai, kurie šalyje praleidžia ilgiau nei 28 dienas, privalo turėti įrodymą apie atliktą vakcinaciją nuo poliomielite.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Majotas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Malaizija</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Šalyje yra riboti maži maliarijos židiniai atokiose vietovėse (Sabo, Saravako ir

	<p>Peninsularo). Rizikos nėra miestuose ir pakrantės teritorijose. Pranešama apie registruotus infekcijos atvejus dėl <i>P. knowlesi</i> sukėlėjo. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Malavis</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Maldivai</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai vykstantys/atvykstantys į/iš endeminių poliomielioto teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomielioto vakcinaciją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Malis</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos. Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie kelias tik į Sacharos dykumą.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Malta</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Jei yra</p>

	<p>būtina, jaunesni nei 9 mėn. kūdikiai, atvykstantys iš infekuotų teritorijų, gali būti izoliuojami ar stebimi.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Marokas</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Maršalo salos</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Martinika</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Mauricijus</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Mauritanija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos. Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie kelia tik į Sacharos dykumą.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje išskyrus šiaurines teritorijas: Dakhlet-Nouadhibou ir Tiris-Zemour. Liepos - spalio mėn. (liūčių laikotarpiu) maliarijos rizika vyrauja Adrar ir Inchiri teritorijose. Taip pat šalyje registruotas atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Meksika</b>	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, retai lankomose turistų. Nedidelė infekcijos rizika vyrauja Chiapas teritorijoje. Tokiose šalies teritorijose kaip: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo maliarijos rizika labai maža. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Mianmaras (anksčiau Birma)</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Nuolatiniams Mianmaro gyventojams bei rezidentams (laikiniams gyventojams) vykstantiems į geltonojo drugio infekuotas teritorijas reikia pateikti skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikatą.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo, miškingose, kalnuotose ir pakrančių teritorijose Rahkine State. Registruotas atsparumas MEF Kayin State ir rytinėje Shan State teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. Šalyje registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. <u>Rekomenduojama profilaktika: C, o pietryčių Mianmare: D.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Mikronezijos Federacinės Valstijos</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Moldovos Respublika</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Monakas</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Mongolija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.

	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Monseratas	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Mozambikas	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų (išskyrus šias teritorijas: Pietų Sudanas, San to Tomė ir Prinsipė, Somalis, Jungtinė Tanzanijos Respublika Afrikoje, Argentina, Prancūzijos Gviana, Paragvajaus esančio Pietų Amerikoje) bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją (išskyrus prieš tai minėtas teritorijas).</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Namibija	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Geltonojo drugio infekuotomis teritorijomis laikomos šalys ar dalis jų teritorijos, esančios Pietų Amerikos ir Afrikos endeminėse zonose. Geltonojo drugio sertifikato nereikalaujama skrendant iš neinfekuotų teritorijų planuotu tranzitu per infekuotas šalis. Visiems keliautojams, kurie skrenda iš infekuotų teritorijų ar nesuplanuotu tranzitu per infekuotas šalis reikalaujama skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato, tačiau jaunesniems nei 1 metų kūdikiams, nereikalaujama turėti skiepavimo nuo geltonojo drugio sertifikato, bet jie gali būti kurį laiką stebimi.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio - birželio mėn. Ohangwena, Otjozondjupa, Oshana, Oshikoto, Omusati, Omaheke rajonuose ir visus metus prie Kunenės upės ir Caprivi bei Kavango regionuose. <u>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Naujoji Kaledonija	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Pastaba.</b> Jei šalyje kiltų epidemijos pavojus, gali būti reikalaujama</p>

	<p>specialaus vakcinacijos sertifikato.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Naujoji Zelandija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Nauru</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Nepalas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus kai kuriose kaimo vietovėse, ypač 20-yje Terai pasienio rajonuose ties siena su Indija bei tarp kalvų. Infekcijos protrūkiai dėl <i>P. falciparum</i> būdingi ypač liepos – spalio mėn.). <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai, atvykstantys į šią šalį turi būti pasiskiepiję nuo poliomielite.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Nigerija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų geltonojo drugio teritorijų. Taip pat keliautojams vykstantiems į šią šalį rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielite, suaugusiems</p>

	difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Nigeris</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš infekuotų geltonojo drugio teritorijų bei išvykstančių iš Nigerio. Taip pat visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos rekomenduojama pasiskiepyti nuo geltonojo drugio. Nerekomenduojama skiepytis tiems keliautojams, kurie kelias tik po Sacharos dykumą.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, poliomielitas, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Nikaragva</b>	<b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (82 proc.) vyrauja visus metus didesnėje šalies teritorijose: Autónoma del Atlántico Norte regionuose, Boaca, Chinandega, Jinotega, León ir Matagalpa. Maža rizika centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje. <u>Rekomenduojama profilaktika rizikos teritorijose: B.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Niujė (Naujoji Zelandija)</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Nyderlandai</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Norvegija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Olandijos Antilai</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.

(Nyderlandų Antilai)	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Omanas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> 2010 m. buvo registruoti vietiniai <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> protrūkiai Ash Sharqiyah North Governorate teritorijoje. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Pakistanas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> ir <i>P. vivax</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 2000 m. jūros lygio, liepos – gruodžio mėn. kaimo vietovėse. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai išvykstantys ir atvykę (pvz.: >4 savaitėms) į šalį privalo turėti įrodymą (Tarptautiniame skiepavimo ar profilaktikos priemonių pažymėjime) apie atliktą poliomielite (OPV) vakcinaciją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Palau</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.
<b>Panama</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija,</u> todėl nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į rytus nuo Panamos Kanalo zonos (Comarcas of Emberá ir Kuna Yala, Darién ir Colón provincija). Skiepytis nuo geltonojo drugio nerekomenduojama vykstantiems į vakarus nuo Panamos Kanalo zonos, pačioje Panamos kanalo teritorijoje, Panamos mieste, Balbao ir San Blas salose.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (>99 proc.) vyrauja visus metus provincijose prie Atlanto krantų ir ties siena su Kosta Rika ir Kolumbija: Bocas del Toro, Chiriqui, Colon, Darien, Ngobe Bugle, Panama ir Veraguas. Panamos mieste, Kanalo zonoje ir kitose provincijose rizika maža arba visai nėra. <u>Rekomenduojama profilaktika: rizikos</u>

	<p>teritorijose – B, rytinėse šalies endeminėse teritorijose: C.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Papua - Naujoji Gvinėja	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, esančioje žemiau nei 1800 m. jūros lygio. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Paragvajus	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams. Nerekomenduojama skiepytis asmenims vykstantiems į Asuncion miestą.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Vyrauja vidutinė <i>P. vivax</i> rizika kai kuriose šalies teritorijose (Alto Parana ir Caaguazu). <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai atvykstantys į šalį turi būti pasiskiepiję nuo tymų, raudonukės.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Peru	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl nuo geltonojo drugio rekomenduojama pasiskiepyti visiems vyresniems nei 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į šalies rizikos teritorijas (miškingas teritorijas, džiungles, esančias žemiau kaip 2300 m virš jūros lygio): Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno, Cuzco; Junín, Pasco ir Huánuco, Apurimac; šiaurės Huancavelica; šiaurės rytai Ancash; rytų La Libertad; šiaurės ir rytų Cajamarca; šiaurės ir šiaurės rytų Ayacucho ir rytų Piura. Vykstantiems tik į Andes, Cuzco miestą, Limą, Machu Picchu, Inca taką skiepytis nerekomenduojama.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (84 proc.), <i>P. falciparum</i> (16 proc.) vyrauja visus metus kaimo teritorijose, esančiose žemiau nei 2000 m. jūros lygio. Rizikos rajonai yra Ayacucho, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Piura ir Tumbes teritorijose. 99 proc. <i>P. falciparum</i> atvejų buvo registruoti Loreto apskrityje, šalia Amazonės. Taip pat registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika <i>P. vivax</i> rizikos teritorijose: B; Loreto apskrities teritorijose - C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,</p>

	hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Pietų Afrikos Respublika</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus kai kuriose Mpumalango provincijose (įskaitant Krugerio Nacionalinį parką), Šiaurės provincijose ir šalies šiaurės rytinės dalies KwaZulu-Natal srityje į pietus iki Tugela upės. Didžiausia infekcijos rizika spalio-gegužės mėn. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Pietų Sudanas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Pitkerno sala</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Portugalija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Prancūzija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Prancūzijos Gviana</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio

	<p>infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Didelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (45 proc.), <i>P. vivax</i> (55 proc.) vyrauja visus metus teritorijose, besiribojančiose su Brazilija (Oiapoque river valley) ir Surinamu (Maroni river valley). 13 apskričių teritorijose, infekcijos rizika maža. Taip pat kur vyksta migracija iš Brazilijos yra registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas daugumai antimaliarinių vaistų. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Prancūzijos Polinezija</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Puerto Rikas</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Pusiaujo Gvinėja</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija.</u> todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 6 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Rejunjonas</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

<b>Rytų Timoras</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Ruanda</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Rumunija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Rusija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Labai ribota infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> tose rajonuose, kuriuose didelė migracija iš pietų šalių. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Salamono salos</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus, išskyrus kai kurias rytines ir pietines saleles. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

Salvadoras	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Labai maža infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja kaimiškose vietovėse. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Samoa	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
San Marinas	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
San Tomė ir Prinsipė	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Saudo Arabija	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Didžiausia infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugsėjo-sausio mėn. visose šalies teritorijose, įskaitant pietinę sieną su Jemenu. Maliarijos rizikos nėra Mekoje ir Medinoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai, vykstantys į Umrą ir Hajj teritorijas, turi pateikti galiojantį sertifikatą apie atliktą vakcinaciją su keturvalente vakcina (A, C, Y, W135) nuo meningokokinės infekcijos (ne anksčiau kaip 10 dienų iki išvykimo ir ne vėliau kaip 3</p>

	<p>metai iki atvykimo į Saudo Arabiją). Taip pat visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomieliito teritorijų privalo turėti įrodymą apie atliktą poliomieliito vakcinaciją (bent 4 savaites iki išvykimo turi būti pasiskiepiję). Visi keliautojai, atvykę į Saudo Arabiją ir nepriklausomai nuo amžiaus ir skiepijimo būklės šalies pasienyje bus paskiepyti 1 OPV doze.</p>
<p><b>Seišeliai</b></p>	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p> <p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojams, atvykstantiems iš šalių, kuriose dar registruojami poliomieliito protrūkiai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomieliito.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Sen Pjeras ir Mikelonas</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepijimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Senegalas</b></p>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Mažesnė infekcijos rizika vyrauja sausio-birželio mėn. tik Centrinuose vakarų regionuose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<p><b>Serbija</b></p>	<p>Nėra privalomų skiepijimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Siera Leonė	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų amžiaus keliautojų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Singapūras	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų arba per paskutines 6 dienas buvusių bei vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Maliarija.</b> Vyrauja infekcijos rizika dėl <i>P. knowlesi</i> . <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Sirijos Arabų Respublika	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> yra ribota, ir vyrauja gegužės-spalio mėn. ties šiaurine šalies siena, ypač šiaurės rytinėje dalyje ir El Hasaka Governorate kaimo vietovėse (maliarijos atvejų neregistruota nuo 2005 m.). <u>Profilaktika nekomenduojama.</u>
	<b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai, atvykstantys iš endeminių poliomielioto teritorijų: Kamerūno, Pusiaujo Gvinėjos, Pakistano, bei keliautojai vykstantys iš Sirijos Arabų Respublikos į kitas šalis privalo būti pasiskiepiję nuo poliomielioto.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Slovakija	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Slovėnija	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
Somalis	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų

	<p>vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik į šiuos regionus: Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle ir Middle Shabelle.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja Centrinėje ir Pietinėje šalies dalyje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Sudanas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotą teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat geltonojo drugio sertifikato gali reikalauti keliautojų išvykstančių iš Sudano. Pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams vykstantiems į pietus nuo Sacharos dykumos. Nerekomenduojama skiepytis keliautojams, kurie keliaus tik Sacharos dykumoje ir į Khartoum miestą.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje. Labai maža rizika vyrauja šalies šiaurėje, Raudonosios jūros pakrantėje, didesnė rizika – centrinėje bei pietinėje šalies dalyje. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Suomija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Surinamas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotą teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems amžiaus keliautojams.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> (40 proc.), <i>P. vivax</i> (58 proc.), abiejų kombinacija 2 proc. vyrauja visus metus centrinėje šalies dalyje, kalnuotose savanos vietovėse. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja ties rytine šalies siena ir aukso kasybos rajonuose. Labai nedidelė rizika – Paramaribo mieste bei kitose pakrantės vietovėse.</p>

	<p><u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Svazilandas</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p> <p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose žemumose, ypač Big Bende, Mhlume, Simunye ir Tshaneni. Didžiausia infekcijos rizika vyrauja lapkričio – gegužės mėn. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Šiaurės Marianos salos</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Šri Lanka</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Maliarija.</b> Maža infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (88 proc.), <i>P. falciparum</i> (12 proc.) rizika vyrauja visus metus visoje šalies teritorijoje, išskyrus Colombo, Kalutara, Gampaha, Galle, Matara, Nuwara Eliya. <u>Profilaktika nerekomenduojama.</u></p> <p><b>Kiti reikalavimai:</b> visi keliautojai atvykstantys iš endeminių poliomielite teritorijų privalo turėti įrodymą apie atlikta poliomielite vakcinaciją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Šv. Bartolomėjaus sala</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p> <p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Šv. Elenos sala</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>

	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šv. Kristoferis ir Nevis	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Kiti reikalavimai:</b> keliautojai, atvykstantys iš šalių, kuriose dar registruojami poliomielito atvejai, turi būti pasiskiepiję nuo poliomielito (OPV).</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šv. Liucija	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šv. Martyno sala	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šv. Vincentas ir Grenadinai	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Švedija	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
Šveicarija	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>

Tadžikistanas	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja birželio-spalio mėn. ties pietine šalies siena (Khatlon regionas), kai kuriose centrinėse (Dushanbe), vakarinėse (Gorno-Badakhshan) ir šiaurinėse (Leninabad regionas) šalies teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: rizikingose teritorijose dėl <i>P. vivax</i> - B, o pietinėje šalies dalyje arčiau Afganistano sienos: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.</p>
Tailandas	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika vyrauja visus metus kaimo teritorijose, ypač – miškingose, kalnuotose vietovėse, taip pat šalies pasienyje. Infekcijos rizikos nėra didžiuosiuose miestuose (Bangkok, Chiang, Mai, Pattaya ir kituose miestuose), Samui ir Phuket salose. Registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas MEF, kai kuriose teritorijose ties šalies siena su Kambodža ir Mianmariu, o <i>P. vivax</i> atsparumas – CHL; Taip pat registruoti <i>P. knowlesi</i> atvejai. <u>Rekomenduojama profilaktika: rizikingose teritorijose A, o prie Kambodžos ir Mianmaro sienų: D.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.</p>
Tanzanija	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose, esančiose žemiau nei 1800 m jūros lygio. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabilgės revakcinacija.</p>
Togas	<p><b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u>, todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabilgės</p>

	revakcinacija.
<b>Tokelau salynas</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Tonga</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Trinidadas ir Tobagas</b>	<b>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u></b> , todėl geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų. Taip pat pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams, į kurių maršrutą yra įtrauktas Trinidadas. Keliaujantiems vykstantiems kruiziniais laivais ar oro transportu tik į Tobagą - skiepytis nebūtina.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Tunisas</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Turkija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Ribota infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> vyrauja gegužės-spalio mėn. įskaitant ir Mardin provincijoje. Infekcijos rizikos nėra turistų lankomose vakarinės ir pietvakarinės šalies dalies teritorijose. Pavieniai atvejai buvo registruoti 2014 m. <b><u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u></b>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Turkmėnistanas</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

<b>Tuvalu</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Uganda</b>	<b>Geltonasis drugys. <u>Endeminė šalies teritorija</u>,</b> todėl geltonojo drugio skiepo ir geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš visų vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Ukraina</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Urugvajus</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Uzbekistanas</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Pavieniai infekcijos atvejai dėl <i>P. vivax</i> buvo registruoti kai kuriuose pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose, besiribojančiuose su Afganistanu, Kirgizija ir Tadžikistanu. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Vanuatu</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Maliarija.</b> Maža ar vidutinė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose. Registruotas <i>P. vivax</i> atsparumas CHL. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A,

	vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Veiko sala</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Volisas ir Futūna</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusiu tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Venesuela</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> <u>Endeminė šalies teritorija</u> , todėl pasiskiepyti nuo geltonojo drugio rekomenduojama visiems vyresniems kaip 9 mėn. amžiaus keliautojams. Skiepytis nerekomenduojama tiems keliautojams, kurie keliaus tik į Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas ir Yaracuy, Distrito Federal valstijas. Taip pat vykstant į teritorijas esančias aukščiau nei 2300 m. aukštyje: Trujillo, Merida, ir Tachira; Falcon ir Lara; Margaritas Sala; Caracas; Valencia.
	<b>Maliarija.</b> Didelė infekcijos rizika dėl <i>P. vivax</i> (75 proc.) ir <i>P. falciparum</i> (25 proc.) vyrauja visus metus kai kurių rajonų (Amazonas, Anzoategui, Bolívar, Delta Amacura) kaimo vietovėse. Maža infekcijos rizika vyrauja Apure, Monagas, Sucre ir Zulia vietovėse. Dažniausia <i>P. falciparum</i> rizika - Amazono (Alto Orinoco, Atabapo, Atures, Autana, Manapiare) ir Bolivaro (Cedeno, Ell Callao, Heres, Gran Sabana, Raul Leoni, Piar, Rocio, Sifontes ir Sucre) džiunglių teritorijose. Taip pat registruotas <i>P. falciparum</i> atsparumas CHL, sulfadoksinui – pirimetaminui. <u>Rekomenduojama profilaktika: <i>P.vivax</i> rizikos teritorijose - B, <i>P. falciparum</i> rizikos teritorijose C.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Vengrija</b>	Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.
<b>Vietnamas</b>	<b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų.
	<b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus išskyrus miesto centrus: Red Riverio ir Mekong deltas bei pakrantės lygumą Centriniam Vietname. Didžiausia infekcijos rizika yra kalnuotose vietovėse žemiau nei 1500 m. jūros lygio 18°N į pietus esančiose teritorijose, ypač – Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai ir Kon Tum,

	<p>Binh Phuoc provincijose bei vakarinėse Khanh Hoa, Ninh Thuan, Quang Nam and Quang Tri pakrantės vietovėse. Taip pat yra registruotas atsparumas MEF. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Vokietija</b>	<p>Nėra privalomų skiepimų reikalavimų keliautojams.</p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Zairas</b>	<p><i>Žr. Kongo Demokratinė Respublika.</i></p>
<b>Zambija</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją. Taip pat skiepytis nuo geltonojo drugio paprastai nerekomenduojama keliautojams, vykstantiems į šias teritorijas: Šiaurės Vakarų ir Vakarų provincijas.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja visus metus visose šalies teritorijose, įskaitant ir Lusaką. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Zimbabvė</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama iš vyresnių kaip 9 mėn. amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja lapkričio – birželio mėn. teritorijose, esančiose žemiau nei 1200 m. jūros lygio ir visus metus Zambezės žemumoje. Maža infekcijos rizika vyrauja Harare ir Bulawayo rajonuose. <u>Rekomenduojama profilaktika: C.</u></p>
	<p><b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B., vidurių šiltinė, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.</p>
<b>Žaliojo Kyšulio salos (Cape Verde)</b>	<p><b>Geltonasis drugys.</b> Geltonojo drugio sertifikato reikalaujama tik iš vyresnių kaip 1 metų amžiaus keliautojų, atvykstančių iš geltonojo drugio infekuotų teritorijų bei keliautojų vykusių tranzitu (daugiau nei 12 valandų oro uoste) per infekuotą teritoriją.</p>
	<p><b>Maliarija.</b> Nedidelė infekcijos rizika dėl <i>P. falciparum</i> vyrauja rugsėjo-lapkričio mėn.,</p>

	įskaitant Santiago salą ir Boavista salą. <u>Rekomenduojama profilaktika: A.</u>
	<b>Rekomenduojama vakcinacija dėl kitų rizikos veiksnių (infekcijų):</b> hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, meningokokinė infekcija, suaugusiems difterijos, stabligės revakcinacija.

**Informacija apie skiepėjimus keliautojams bei profilaktinių skiepimų atlikimą teikiama Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre Nugalėtojų g. 14D, Vilnius.**

**Tel. 8 5 2159273; 8 5 2300124**

**El. paštas: [keliautojams@ulac.lt](mailto:keliautojams@ulac.lt);**

**Daugiau informacijos galite rasti internetinėje svetainėje: [www.ulac.lt](http://www.ulac.lt); <http://www.ulac.lt/lt/keliautojams> .**

### **Informacijos šaltiniai:**

1. Countries with risk of yellow fever transmission and countries requiring yellow fever vaccination. *World health Organization*. Geneva, 2016, July 11. [<http://www.who.int/ith/2016-ith-annex1.pdf?ua=1>].
2. International travel and health. *World health Organization*. [<http://www.who.int/ith/en/>].
3. Vaccination requirements and recommendations for international travellers, including yellow fever and malaria (List of countries, territories and areas). *World health Organization*. Geneva, 2016. [<http://www.who.int/ith/2016-ith-country-list.pdf?ua=1>].
4. Yellow fever & Malaria information , by country. CDC Health Information for International Travel (Yellow Book). *Centers for Disease Control and Prevention*. USA, 2016. [<http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/yellow-fever-malaria-information-by-country#select-seldyfm707>].