


- ❖ Užsikrėtus hepatito B virusu, dauguma ligonių pasveiksta, tačiau iki 10 proc. suaugusiųjų suserga lėtiniu hepatitu B.
- ❖ Iki 85 proc. užsikrėtusiųjų hepatito C virusu tampa lėtinės infekcijos nešiotojais.
- ❖ Negydomas lėtinis virusinis hepatitas C, praėjus 15-20 metų nuo užsikrėtimo pradžios, komplikuojasi į kepenų cirozę, kepenų nepakankamumą ar kepenų vėžį.
- ❖ Apie 80 proc. žmonių, užsikrėtusių hepatito C virusu, ir 50-60 proc. žmonių, užsikrėtusių hepatito B virusu, nejaučia jokių simptomų.
- ❖ ŽIV infekcijai būdingas ilgas (8-10 metų) besimptomis periodas, kuomet žmogus atrodo gerai ir jaučiasi sveikai, tačiau tuo metu pats to nežinodamas platina infekciją tarp kitų.
- ❖ Galima pasiskiepyti nuo virusinio hepatito B, tačiau nėra vakcinų, apsaugančių nuo virusinio hepatito C.
- ❖ Rizika užsikrėsti ŽIV ar hepatito B virusu, sumažėja, jei lytiniai partneriai pasirenka saugesnę lytinę elgseną.



Daugiau informacijos  
[www.ulac.lt](http://www.ulac.lt)

**UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS  
 CENTRAS**

ADRESAS: NUGALĖTOJŲ G. 14D,  
 LT-10105 VILNIUS

TEL.: (8-5) 230 0125

EL.PAŠTAS: [ULAC@ULAC.LT](mailto:ULAC@ULAC.LT)

## VIRUSINIAI HEPATITAI B IR C, ŽIV INFEKCIJA



**ULAC**

<b>PLINTA AR NE?</b> <b>X</b> - NE <b>✓</b> - TAIP	<b>Hepatitis B</b>	<b>Hepatitis C</b>	<b>ŽIV infekcija</b>
