

Kokios yra galimos gonorėjos komplikacijos?

- Jeigu gonorėja pradedama gydyti laiku, retai atsiranda ilgalaikių problemų. Negydoma gonorėja gali išplisti į kitas kūno dalis ir sukelti komplikacijų.
- Moterims gali išsivystyti mažojo dubens uždegimas (MDU), kuriam būdingas pilvo ar dubens skausmas. MDU padidina riziką negimdiniam nėštumui ir sukelia nevaisingumą. Vyrams gali išsivystyti sėklidės priedo uždegimas (epididimitas).
- Retais atvejais negydant gonorėjos, ji gali išplisti į kraujotaką ir sukelti infekcijas odoje ir sąnariuose.

Gonorėja ir nėštumas


- Jeigu esi nėščia, gonorėja gali būti perduota tavo kūdikiui gimdymo metu. Naujagimio organizme infekcija gali sukelti konjunktyvitą (akių junginės uždegimą).

Ar aš turėčiau apie tai pasakyti savo partneriams?

- Jeigu esi užsikrėtęs gonorėja, turi pranešti apie tai savo lytiniams partneriams, kad šie būtų ištirti ir gydomi.
- Lytinių partnerių gydymas neleis tau vėl užsikrėsti infekcija ir tuo pačiu lytiniai partneriai būtų apsaugoti nuo komplikacijų išsivystymo.

Kas yra saugesnė lytinė elgsena?

- Siekiant apsisaugoti nuo LPI, įskaitant gonorėją, rekomenduojama vengti atsitiktinių lytinių santykių, mažinti lytinių partnerių skaičių bei nuolatos ir teisingai naudoti prezervatyvus lytinių santykių (vaginalinių, oraliųjų, analinių) metu.



Daugiau informacijos
www.ulac.lt

Gonokokinė infekcija
(sin. – gonorėja) –
Paciento informacinis lapelis



Pagrindinė informacija

Gonokokinė infekcija yra lytiškai plintanti infekcija

Lengvai perduodama lytinių santykių (vaginalinių, oraliųjų, analinių) metu

Gydymas yra nesudėtingas

Laiku nediagnozuota sukelia reprodukcinės sveikatos sutrikimų (pvz., nevaisingumą)

Tu gali save apsaugoti VISADA naudodamas prezervatyvus lytinių santykių metu

Kas yra gonokokinė infekcija? (sin. gonorėja)

Gonokokinė infekcija yra lytiškai plintanti infekcija (LPI). Ją sukelia bakterija – *Neisseria gonorrhoeae*.



Kaip tu gali užsikrėsti?

■ Gonorėja tu gali užsikrėsti lytiškai santykiaudamas su tuo, kuris yra užsikrėtęs šia infekcija. Dažniausiai infekcija perduodama vaginalinių ir analinių lytinių santykių metu.

■ Gonorėja iš visų LPI perduodama bene dažniausiai, ji ypač dažna tarp jaunų žmonių, dažnai keičiančių lytinius partnerius ir tu, kurie nenaudoja prezervatyvų lytinių santykių metu, tarp vyrų, turinčių lytinius santykius su vyrais.

■ Nežiūrint į tai, kad gonorėja pagydoma, tu gali ja užsikrėsti pakartotinai.

Kokį gonorėjos simptomai?

■ Daugiau nei 50 proc. moterų ir 10 proc. vyrų, užsikrėtusių gonorėja, nebūna jokių simptomų. Jei simptomai atsiranda, tai dažniausiai praėjus 2 – 7 dienoms po užsikrėtimo.

Dažniausi simptomai moterims yra:

- Pagausėjusios ir pakitusios išskyros iš makšties
- Padažnėjęs ir skausmingas šlapinimasis
- Kraujavimas tarp menstruacijų
- Skausmas ar diskomfortas mažajame dubenyje

Dažniausi simptomai vyrams yra:

- Pūlingos ir gausios išskyros iš šlaplės
- Deginimo jausmas, skausmas šlapinantis
- Skausmas ar diskomfortas sėklidėse

Dažniausi simptomai moterims ir vyrams, užsikrėtusiems gonorėja per analinius lytinius santykius, yra:

- Išangės niežulys
- Šlapiavimas
- Kraujavimas
- Skausmingas tuštinimasis

Ar aš turėčiau išsitiirti?

■ Jeigu tu manai, kad turėjai lytinį kontaktą su asmeniu, užsikrėtusiu gonorėja ar kitomis LPI, arba jauti gonorėjai būdingus simptomus, turėtum kreiptis į savo šeimos gydytoją, ginekologą ar dermatovenerologą.

■ Jeigu esi užsikrėtęs gonorėja, taip pat turėtum išsitiirti dėl kitų LPI – hepatito B, chlamidinės

infekcijos, sifilio, ŽIV, nes gali sirgti keliomis LPI vienu metu.

Koks yra gonorėjos gydymas?

■ Svarbu kuo greičiau pradėti gonorėjos gydymą, kadangi negydoma infekcija gali sukelti komplikacijų.

■ Gydymą skiria gydytojas. Lytiniai partneriai turi būti gydomi kartu.

Ar aš galėčiau lytiškai santykiuoti, jei esu užsikrėtęs gonokokinė infekcija?

■ Turėtum vengti bet kokių lytinių santykių, net ir naudojant prezervatyvą, kol tu ir tavo partneris nebaigsite viso gydymo kurso ir kol simptomai neišnyks.

