

Ar aš galėčiau lytiškai santykiuoti, jei esu užsikrėtęs sifiliu?

✚ Turėtum vengti bet kokių lytinių santykių, kol tu ir tavo partneris nebaigsite viso gydymo kurso ir kol neišnyks simptomai.

Kokios yra galimos sifilio komplikacijos?

✚ Jeigu sifilis pradamas gydyti laiku, retai atsiranda ilgalaikių problemų. Tačiau negydant sifilis gali išplisti į kitas kūno dalis ir sukelti komplikacijų.

✚ 1 iš 10 asmenų negydant sifilio išsivysto rimti nervų sistemos, smegenų, kaulų ir širdies pažeidimai. Jų gali neatsirasti ir keletą metų.

✚ Kai kurių tyrimų rezultatai dėl sifilio po gydymo bus teigiami visą gyvenimą. Tai nereiškia, kad tau reikia tolimesnio gydymo, bet turi prisiminti, kad buvai gydytas nuo sifilio (ir turėti kraujo tyrimo rezultatų kopiją), kad ateityje apie tai galėtum pasakyti gydytojui, jeigu jis to paklaus.

Sifilis ir nėštumas

✚ Jeigu esi nėščia, sifilis gali būti perduotas vaisiui nėštumo metu. Jei užsikrėtusi motina negydoma nėštumo metu, gresia neišnešiojimas, vaisiaus mirtis ar rimti kūdikio susirgimai (įgimtas sifilis). Nustačius sifilį nėštumo metu skiriamas saugus gydymas. Lietuvoje dėl sifilio tiriamos nėščios moterys pirmąjį kartą iki 12 nėštumo savaitės ir 2 kartą – nuo 29 iki 40 nėštumo savaitės.

Ar aš turėčiau apie tai pasakyti savo partneriams?

✚ Jeigu sergi pirminiu ar antriniu sifiliu, apie tai turėtum pranešti savo lytiniam partneriams, kad jie būtų ištirti ir gydomi.

✚ Lytinių partnerių gydymas neleis tau vėl užsikrėsti sifiliu ir tuo pačiu lytiniai partneriai būtų apsaugoti nuo komplikacijų išsivystymo.

Kas yra saugesnė lytinė elgsena?

✚ Siekiant apsaugoti nuo LPI, išskaitant sifilį, rekomenduojama vengti atsitiktinių lytinių santykių, mažinti lytinių partnerių skaičių bei nuolatos ir teisingai naudoti prezervatyvus lytinių santykių (vaginalinių, oralinių, analinių) metu.

Daugiau informacijos

www.ulac.lt

Sifilis – Paciento informacinis lapelis



Pagrindinė informacija

Sifilis yra lytiškai plintanti infekcija

Lengvai perduodama lytinių santykių (vaginalinių, oralinių, analinių) metu,


Gydymas yra nesudėtingas

Negydant sifilio, gali kilti rimtų ilgalaikių sveikatos problemų

Tu gali save apsaugoti VISADA naudodamas prezervatyvus lytinių santykių metu

Kas yra sifilis?

Sifilis yra lytiškai plintanti infekcija (LPI). Ją sukelia bakterija – *Treponema pallidum*.



Kaip tu gali užsikrėsti?

✚ Sifiliu tu gali užsikrėsti lytiškai santyki audamas su tuo, kuris yra užsikrėtęs šia infekcija. Bakterija į organizmą patenka per gleivines (lyties organų, burnos, tiesiosios žarnos) ar odos smulkčius pažeidimus (įtrūkimus) tiesioginio kontakto, dažniausiai lytinių santykių (vaginalinių, oralių, analinių) metu.



✚ Infekcija yra dažnesnė tarp žmonių, kurie dažnai keičia lytinius partnerius ir tu, kurie nenaudoja prezervatyvų lytinių santykių metu, tarp vyrų, turinčių lytinius santykius su vyrais.

✚ Nežiūrint į tai, kad sifilis pagydomas, tu gali užsikrėsti juo pakartotinai.

Kokie sifilio simptomai?

✚ Požymiai ir simptomai vienodi tiek moterims, tiek vyrams. Skiriamas:

1. Ankstyvas sifilis (iki 2 metų trukmės nuo užsikrėtimo)

Pirminis sifilis

Paprastai praėjus 2 – 3 savaitėms (10 – 90 d.) po užsikrėtimo infekcijos patekimo vietoje atsiranda opelė (kietasis šankeris). Paprastai tai būna viena neskausminga, apvali, nedidelė opelė dažnai ant varpos vyrams, ant vulvos ar vaginoje, ant gimdos kaklelio moterims, arba išangėje. Priklausomai nuo to, kur yra opelė, tu gali jos ir nepastebėti. Opelė išnyksta per 3 – 6 savaites, tuo metu tu gali užsikrėsti kita asmeni.

Antrinis sifilis

Antrinis sifilis negydant prasideda praėjus 3-6 savaitėms po kietojo šankerio atsiradimo. Bakterija patenka į kraujotaką ir pažeidžia daugelį organų. Tu gali pastebėti neniežtinti odos bėrimą bet kurioje kūno vietoje, dažnai atsirandanti delnuose ir paduose, ataugas lytinių organų gleivinėje (plačiasias kondilomas), padidėjusias tonziles ir baltas apnašas burnoje, padidėjusius neskausmingus limfmazgius ar rečiau išslinkusių galvos, barzdos, antakių plaukų lopinėlius, gali išsivystyti kurtumas, kepenų, inkstų ar smegenų uždegimas, kilti akių problemų. Antrinis sifilis yra labai užkrečiamas.

Be gydymo antrinio sifilio bėrimas ir kiti simptomai išnyksta paprastai po keleto savaičių. Tačiau, simptomai gali tęstis keletą metų.

Latentinis (slaptasis) ankstyvas sifilis

Po antrinio sifilio simptomų išnykimo gali nebūti jokių požymių keletą metų, bet infekcija bus nustatoma iš kraujo tyrimo.

2. Vėlyvas sifilis (susergama vėliau nei po dviejų metų nuo užsikrėtimo)

1 iš 10 asmenų negydant sifilio išsivysto rimti nervų sistemos, smegenų, kaulų ir širdies pažeidimai. Tai atsitinka dažniausiai praėjus 5 – 10 metų nuo užsikrėtimo pradžios.

Ar aš turėčiau išsitiirti?

✚ Jeigu tu manai, kad turėjai lytinį kontaktą su asmeniu, užsikrėtusiu sifiliu, arba pasireiškė sifiliui būdingi požymiai, turėtum kreiptis į šeimos gydytoją, ginekologą ar dermatovenerologą.

✚ Jeigu esi užsikrėtęs sifiliu, taip pat turėtum išsitiirti dėl kitų LPI – hepatito B, chlamidinės infekcijos, sifilio, ŽIV, nes gali sirgti keliomis LPI vienu metu.

Koks yra sifilio gydymas?

✚ Svarbu kuo greičiau pradėti sifilio gydymą, kadangi negydoma infekcija gali sukelti komplikacijų ir rimtų sveikatos problemų.

✚ Gydymą skiria gydytojas. Lytiniai partneriai turi būti gydomi kartu.