

PASITIKRINTI DĖL ŽIV REKOMENDUOJAMA:

1. nėščiosioms
2. kai kosima ilgiau kaip mėnesį
3. dažnai (daugiau kaip 2k. per metus) sergant plaučių uždegimais, bronchitais, gerklės, ausų ir kitais uždegimais
4. kai karščiuojama ilgiau kaip mėnesį
5. kai viduriuojama ilgiau kaip mėnesį
6. be priežasties netekus daug svorio (daugiau kaip 10 proc.)
7. kai nuolat jaučiamas nuovargis ir silpnumas
8. kai naktimis gausiai prakaituojama
9. susirgus tuberkulioze
10. padidėjus kaklo, pažastų ar kirkšnies limfmazgiams
11. kai sergate lytinių organų kandidoze (ilgiau kaip 1 mėn.)
12. kai sergate burnos, stemplės ar gerklės kandidoze (ilgiau kaip 1 mėn.)
13. kai turite burnos ir genitalijų opas, neišnykstančias ilgiau kaip 1 mėn.
14. susirgus Herpes infekcija (lėtinės opos, trunkančios ilgiau kaip 1 mėn.)
15. susirgus sifiliu, gonorėja ar kita lytiškai plintančia infekcija
16. susirgus Kaposi sarkoma ar kitais onkologiniais susirgimais
17. susirgus (ar užsikrėtusiems) hepatitu C ar B
18. kai bendrame kraujo tyrime - ENG rodiklis didesnis kaip 65 mm/h



ULAC

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

www.ulac.lt

PASITIKRINTI DĖL ŽIV REKOMENDUOJAMA:

19. turėjus lytinių santykių su vartojančiais ar vartojusiais narkotines ir psichotropines medžiagas
 20. turėjus lytinių santykių su atsitiktiniu lytiniu partneriu
 21. vyrams, turintiems lytinių santykių su vyrais
 22. turėjus lytinių santykių su ŽIV užsikrėtusiu asmeniu
 23. turėjus lytinių santykių su seksualinių paslaugų teikėjais
 24. turėjus lytinių santykių su asmenimis iš šalių, kuriose didelis ŽIV paplitimas (pvz., Afrikos, Estijos, Ukrainos ir kt.)
 25. kai lytiniai partneriai turėjo daugiau nei vieną lytinį partnerį per pastaruosius 12 mėnesių
-
26. vaikams, kuriuos pagimdė narkotines ir psichotropines medžiagas vartojanti motina
 27. vaikams, kuriuos pagimdė ŽIV užsikrėtusi motina
 28. asmenims, turėjusiems sąlytį (įskaitant ir profesinį) su ŽIV užsikrėtusio ar galimai užsikrėtusio asmens krauju ar kitais organizmo skysčiais
 29. asmenims, kuriems pasireiškia ūmiai ŽIV infekcijai būdingi simptomai (į gripą panašūs simptomai, trunkantys 1–2 savaites)
-
30. vartojus ar vartojant švirkščiamasias narkotines ir psichotropines medžiagas
 31. patyrus smurtą ar lytinę prievartą
 32. įsidūrus kažkieno naudota adata